

Nuovi avvistamenti

a cura di EMILIANO ARCAMONE e PIERANDREA BRICHETTI

Questo terzo numero della rubrica *Nuovi avvistamenti* raggruppa numerose interessanti segnalazioni che probabilmente sarebbero finite disperse in varie pubblicazioni. Questo grazie anche all'accordo intercorso tra la nostra redazione e quella della Rivista italiana di Ornitologia. Come di consueto facciamo appello alla collaborazione di tutti, soci e lettori, affinché gli avvistamenti di rilevanza nazionale non si perdano in mille rivoli ma confluiscono in questa nostra rubrica.

Per inviare le segnalazioni si dovrà fare riferimento a:

Emiliano Arcamone (coordinatore), via Adolfo Tommasi 20/C, 57124 Livorno

Svernamento di Strolaga mezzana *Gavia arctica* in Puglia.

L. Scarpina e R. Gennaio

Nell'inverno 1997/98 censimenti serali hanno permesso di individuare 28/30 individui di questa specie in un tratto del Golfo di Gallipoli (LE).

La specie è ritenuta svernante occasionale nel Meridione (Serra et al., 1997. Biol.Cons. Fauna 101:1-312). Osservazioni compiute a partire dall'inverno 1992/93 (L. Scarpina e R. Gennaio ined.) hanno evidenziato la presenza regolare della specie nell'area ionica pugliese (media sei anni: 23 indd).

Avvistamenti di Pellicano *Pelecanus onocrotalus*.

(1) R. Gennaio e L. Scarpina

(2) F. Barbieri e E. Tisio

(3) G. Marzano e K. Sergio

(1) Il 31 dicembre 1996 un individuo di questa specie ha sostato brevemente nel bacino artificiale di Sponderati (Ugento, LE). Dopo poco è stato visto partire verso il mare in direzione Sud-Ovest.

(2) Un individuo adulto di questa specie ha sostato dal 14 ottobre al 15 novembre 1998 nelle cave di argilla di Casei Gerola (PV).

(3) L'11 marzo 1998 nei pressi dei Laghi Alimini (Lecce), in occasione di un periodo di forti venti freddi da Nord, un individuo di questa specie è stato osser-

vato mentre sostava in un campo di grano nei pressi della zona umida. L'esemplare si presentava stremato e, se costretto al volo, si spostava coprendo brevi distanze.

La specie è da considerarsi accidentale (2 precedenti segnalazioni in Puglia, 8 in Lombardia). Gli avvistamenti suggeriscono che la presenza della specie sia legata ad erratismi di individui isolati.

Svernamento di Airone rosso *Ardea purpurea* in Lombardia.

N. Grattini

Un individuo ha sostato dal dicembre 1995 al febbraio 1996 in località Valdaro a Sud di Mantova.

In precedenza erano note presenze molto sporadiche nella Pianura Padana interna, sulle coste dell'alto Adriatico e in Toscana.

Stormo consistente di Cicogna bianca *Ciconia ciconia* in transito nel Livornese (Toscana).

P. Politi

Il 27 agosto 1995 sopra il Padule Orti-Bottagone (Piombino, LI) è transitato uno stormo di 100 individui di questa specie.

Questa specie è di comparsa regolare lungo la costa toscana ma eccezionalmente in grossi gruppi.

Avvistamenti di Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus* in Veneto e Toscana.

(1) L. Carlotto e A. Parise
(2) E. Arcamone, F. Caturegli e Y. Simoncini

(1) Il 24 settembre 1997 è stato avvistato un individuo di questa specie lungo il torrente Astico (Sandrigo, VI). Questo individuo, dopo aver sostato alcuni giorni nella zona, è stato abbattuto. Un altro soggetto è comparso nella stessa zona umida tra il 18 ed il 20 maggio 1998.

(2) Il 13 gennaio 1997 un adulto è stato osservato nel Padule di Suese (Livorno). L'individuo era al dormitorio in compagnia di un grosso gruppo di Garzette *Egretta garzetta* e di Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*. Questo ibis ha sostato nella zona per il resto dell'inverno. Probabilmente lo stesso individuo ha raggiunto il Lago di Massaciuccoli (LU-PI) nel mese di marzo (A. Canci ined.).

La specie ha nidificato regolarmente in Piemonte dal 1995 al 1998 ed è considerata introdotta ma nidificante acclimatata (Carpegna, Della Toffola, Alessandria e Re, 1999. Avocetta 23:82). Ha inoltre nidificato nel 1997 in una garzaia della Laguna di Venezia (F. Panzarin e M. Zanetti, ined.). Il comportamento selvatico dei soggetti osservati può far supporre che questi siano appartenenti alla piccola popolazione italiana.

Sosta di Fenicottero *Phoenicopterus roseus* nel Pavese (Lombardia).

F. Barbieri e E. Tiso

Tre individui di questa specie sono stati osservati il 3 settembre 1997 nelle cave di argilla di Casei Gerola (PV). Due individui (1 ad. e 1 subad.) hanno sostato nella stessa località fino al 22 settembre.

Con il costante aumento della specie nel nostro paese si segnalano un maggior numero di avvistamenti in aree, come ad esempio la Pianura Padana, dove la specie era di comparsa rara.

Osservazioni invernali di Cigno selvatico *Cygnus cygnus* nel Salento (Puglia).

G. Marzano e K. Sergio

Un individuo di questa specie è stato osservato nel mese di gennaio 1997 in località "Canale Giancola", in provincia di Brindisi. L'esemplare sostava in un

acquitrino stagionale. Il 30 dicembre 1998, un altro individuo è stato raccolto in mare, a circa 300 m dalla costa, a Sud dei "Bacini d'Ugento" (LE). Questo cigno era incapace di prendere il volo a causa della frattura di una zampa.

Questi avvistamenti confermano come la Puglia sia la regione meridionale maggiormente frequentata dalla specie.

Avvistamento di Anatra marmorizzata *Marmaronetta angustirostris* in Emilia Romagna.

D. Bonazzi

Il 18 maggio 1999 in una ex risaia del comune di Bentivoglio (BO) è stata avvistata una femmina di questa specie.

Ancora un avvistamento di un individuo la cui origine selvatica non può essere ritenuta certa (si veda questa rubrica Avocetta 21: 220-227).

Avvistamento invernale di Moretta codona *Clangula hyemalis* nel Ferrarese (Emilia Romagna).

C. Bertarelli, A. Gelati, R. Gemmato e C. Giannella

Il 4 gennaio 1998 nel mare prospiciente il Lido di Spina (Comacchio, FE) sono stati avvistati due individui (femmine o giovani).

La specie, regolarmente svernante, anche se in scarso numero, lungo le coste friulane e venete, diventa molto rara a sud di queste.

Avvistamento invernale di Gobbo rugginoso *Oxyura leucocephala* nelle Valli di Comacchio (Emilia Romagna).

M. Bon e L. Melega

Il 13 novembre 1998 un individuo giovane di questa specie è stato osservato nella parte meridionale delle Valli di Comacchio (FE). L'individuo si alimentava in un grosso bacino arginato in prossimità di un gruppo di anatre di superficie e folaghe.

Le segnalazioni della specie successivamente agli '50 si sono fatte sempre più scarse e riferibili ad individui in dispersione post-giovanile (Brichetti e Violani in Brichetti et al. 1992, Fauna d'Italia, Uccelli 1:440-446).

Avvistamento di Capovaccaio *Neophron percnopterus* nell'Appennino piacentino

S. Flères e A. Micheli

Il 9 maggio 1999, alle ore 17,30, durante un'escursione nella media valle del Trebbia, nel comune di Travo (PC), è stato osservato per circa cinque minuti un individuo adulto. Il rapace ha volteggiato e guadagnato quota sopra la sommità del monte Pietra Parcellara (836 m s.l.m.) dirigendosi poi, in planata, a Nord-Ovest, verso l'Oltrepò pavese.

Le segnalazioni precedenti per l'Italia Settentrionale riguardano il Veneto (un individuo immaturo nel 1984: Atti Mem. Accad. Agric. Sci. Lett. Verona, 170, 1996: 79-99) e il Piemonte (tre osservazioni di individui adulti negli anni 1985, 1992, 1994: Riv. ital. Orn. 55, 1985:189-192; Riv. Piem. St. Nat. 14, 1993: 259-279 e 17, 1997: 205).

Avvistamento di Grifone *Gyps fulvus* in Liguria.

L. Baghino

Un individuo è stato osservato il 17 ottobre 1998 in località Beuca di Cogoleto (GE).

La data dell'avvistamento, il primo per la Liguria occidentale (Spanò e Truffi, 1987. Gli Uccelli della Liguria occidentale), è da correlare con i periodi di maggior dispersione (fine estate-inizio autunno), durante i quali la specie si osserva fuori dalle aree in cui è di solito presente.

Avvistamento di Grifone *Gyps fulvus* sulle Prealpi Bergamasche (Lombardia).

D. Rubolini, M. Schiavi, G. Romagnoli e M. Volpi

L'11 ottobre 1998 presso la Stazione Ornitologica "La Passata" Miragolo, S. Marco di Zogno (BG) è stato osservato un individuo giovane, in volo in direzione Sud-Ovest.

Specie accidentale per la regione. Per commenti si veda quanto riportato per la Liguria.

Avvistamento di Grifone *Gyps fulvus* in Sicilia.

M. Di Vittorio

Nel luglio 1995, nelle immediate vicinanze del centro abitato di Sutera (CL) è stato visto volteggiare un individuo immaturo di questa specie.

La specie si è estinta come nidificante in Sicilia nel

1965. Da allora si sono verificate almeno dieci segnalazioni (Iapichino e Massa, 1989. The Birds of Sicily. B.O.U. Check-list n.11), l'ultima delle quali nel 1985 nella stessa località. Il territorio siciliano sembra essere ancora interessato da fenomeni di erratismo di questa specie.

Presenze invernali di Aquila minore *Hieraaetus pennatus*.

(1) P. Giovacchini

(2) M. Angori

(3) S. Fantini

(4) L. Giraud

(1) Il 7 dicembre 1997 è stato osservato nei pressi di Montiano (GR) un individuo in fase chiara.

(2) Nel mese di gennaio 1998 un individuo in fase chiara ha sostato nell'ex padule di Vecchiano (PI).

(3) Il 18 gennaio 1998 sopra l'abitato di Ventimiglia (IP) è stato osservato un individuo in fase chiara di questa specie. L'esemplare mostrava alcune primarie dell'ala sinistra in muta.

(4) Il 7 febbraio 1998 è stato osservato un individuo in volo sopra Valle Mandriole (RV).

Si conferma lo svernamento della specie per la Toscana come rilevato nel 1988 (Arcamone e Tellini, 1991-1992. Quad. Mus. Stor. Nat. Livorno 12:37-66). Si tratta della prima segnalazione invernale della specie per la Liguria (Spano et al., 1998. Atlante degli uccelli svernanti in Liguria. Regione Liguria) e della quarta per l'Emilia Romagna (Foschi, 1986. Uccelli di Romagna. Maggioli, Rimini). Recentemente la specie è ritenuta svernante irregolare per l'Italia (Brichetti e Massa, 1998. Riv.ital. Orn. 68:129-162).

Presenza invernale di Falco pescatore *Pandion haliaetus* nel Ferrarese (Emilia Romagna).

C. Bertarelli, A. Gelati, R. Gemmato e C. Giannella

Il 4 gennaio 1998 un individuo è stato osservato sul mare prospiciente il Lido di Spina (Comacchio, FE). Interessante l'avvistamento della specie lungo le coste adriatiche, attualmente non comprese nell'areale di svernamento conosciuto.

Svernamento di Falco pescatore *Pandion haliaetus* nella Laguna di Orbetello (Toscana).

G. Battaglia, I. Corsi, P. Dall'Antonia

Nell'inverno 1997/98 hanno sostato nella Laguna di Orbetello (GR) fino ad un max di 4 individui.

Dal 1995/96 questa specie ha iniziato a svernare regolarmente in questa laguna (Arcamone ined.). Si tratta della prima segnalazione di svernamento di più d'uno di questi rapaci in Toscana e nell'Italia continentale. Si ricorda che alcune letture di anelli hanno confermato che gli svernanti dell'area tirrenica originano dalla popolazione nidificante in Corsica.

Presenza invernale di Lodolaio *Falco subbuteo* in Lombardia.

N. Grattini e C. Inversi

Un individuo posato su un pioppo è stato osservato il 28 dicembre 1998 presso Quistello (MN).

In precedenza era nota la presenza sporadica di singoli individui svernanti in Liguria, Toscana e Sardegna.

Primo avvistamento di Falco della Regina *Falco eleonora* in Lombardia.

D. Ardigò e P. Cucchi

L'8 luglio 1998 è stato osservato un individuo in fase chiara volteggiare sui pendii del monte Alberelli (Toscolano, BS). Il falco è stato visto alimentarsi di insetti.

Si tratta della prima segnalazione per la Lombardia. Nelle altre regioni settentrionali si sono avute segnalazioni per il Piemonte, la Liguria ed il Friuli-Venezia Giulia.

Avvistamento primaverile di Gallina prataiola *Tetrax tetrax* in Toscana.

D. Gori

Il 7 maggio 1999 in località La Sterpaia (Piombino, LI), area umida bonificata prossima al mare, è stata avvistata una femmina. Questo individuo, che si trovava ai margini di un campo di grano, si è involato posandosi nell'area retrodunale.

La specie è attualmente da considerarsi accidentale in Toscana. Nel passato (almeno fino agli anni '50) era, in questa regione, di comparsa regolare nel periodo primaverile, in ragione del più ampio areale distributivo.

Avvistamenti di Gabbiano del Pallas *Larus ichthyæus* in Toscana.

- (1) F. Haas
- (2) D. Occhiato

(1) Il 26 luglio 1997, nel porto di Livorno, è stato osservato un adulto di questa specie.

(2) L'11 settembre 1999 in prossimità della foce del fiume Serchio (PI) è stato osservato un individuo giovane del 1° inverno. L'individuo si trovava isolato ma a poca distanza da un folto gruppo di Gabbiani reali mediterranei *Larus c. michaellis*.

Si tratta, rispettivamente, della 8° e 9° segnalazione per l'Italia e le prime per la Toscana. È nota nello stesso anno un'osservazione estiva all'Isola di Capraia (Grussu, 1998. Aves Ichnusae 1: 37-40). Considerato ormai specie regolare in Sicilia; questa osservazione toscana, unitamente a quella riportata da Grussu (1998), potrebbero indicare una maggior diffusione della specie anche nel Mediterraneo settentrionale.

Avvistamento di Gabbiano reale pontico *Larus cachinanns cachinanns* sul Lago di Garda (Lombardia).

C. Randler

Alla fine di agosto 1998 presso Torbole, sul Lago di Garda, sono stati osservati cinque adulti di questa sottospecie in compagnia di altri gabbiani.

Analogamente alla sottospecie mediterranea, anche questa è nota compiere una regolare dispersione post-giovanile verso il Centro Europa (Matsievsskaya et al. 1998. Branta 1: 130-142), ove tuttavia non sempre viene identificata. Per l'Italia l'unico dato realmente certo è relativo alla lettura di un anello colorato in Emilia Romagna (Talamelli 1997, Riv.ital.Orn. 67: 106-107).

Prima nidificazione di Sterna comune *Sterna hirundo* e di Fraticello *Sterna albifrons* in Toscana.

P. Sposimo, G. Battaglia, L. Calchetti e F. Cianchi

Nella stagione riproduttiva 1998 è stata accertata la nidificazione delle due specie nella Laguna di Ponente di Orbetello (GR). Sono stati rilevati almeno 2 nidi di Sterna comune e 2 di Fraticello. La nidificazione è avvenuta su isolotti realizzati nel 1995 nell'ambito di

interventi di ripristino ambientale (Sposimo et al., 1997: Avocetta 21:145).

Per entrambe le specie si tratta dei primi casi di nidificazione noti per la Toscana (cfr. Tellini Florenzano et al., 1997. Quad. Mus. Stor. Nat. Livorno - Monografie 1); la pronta colonizzazione degli isolotti utilizzati indica come la mancanza di siti idonei irraggiungibili dai predatori terrestri impedisse la riproduzione delle sterne nella Laguna di Orbetello.

Estivazione di Gufo di palude *Asio flammeus* nel Ferrarese (Emilia Romagna).

N. Grattini

Un individuo è stato ripetutamente osservato posato e in caccia nel giugno 1995 nei pressi dell'Oasi di Bando (FE).

Negli anni '60-'70 sono stati segnalati, senza prove o documentazioni, sporadici casi di nidificazione in Toscana e Lazio. In tempi storici la specie era ritenuta localmente nidificante sulle Alpi, nella Pianura Padana, nelle regioni centrali e nelle isole maggiori. A Malta ha nidificato occasionalmente nel 1906, 1909 e 1983 (Sultana et al. 1982).

Comparsa di Gruccione egiziano *Merops persicus* nel Salento (Puglia)

G. Marzano e K. Sergio

Il 25 aprile 1998 nei pressi di Maglie (LE) è stato rinvenuto morto un individuo di questa specie.

Si tratta della 8° segnalazione per l'Italia, di cui una precedente in Puglia in periodo storico (1874). Recenti indagini, che testimoniano la conoscenza della specie da parte degli abitanti dell'area, la fanno ritenere più frequente di quanto fin ora accertato (Marzano ined.).

Avvistamento di Picchio rosso maggiore *Picoides major* nel Salento (Puglia).

G. Marzano e K. Sergio

L'11 novembre 1998, nei Pressi di Poggiardo (LE), è stato osservato un individuo in un oliveto.

La specie risulta assente nella penisola salentina (Genero in Meschini e Frugis, 1993. Atlante degli uccelli nidificanti in Italia. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina n.20). Primo avvistamento della specie in provincia di Lecce.

Avvistamento di Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris* nel Salento (Puglia).

G. Marzano

Il 19 ottobre 1998, in località S. Angelo (Surbo, LE) è stato osservato un individuo di questa specie. Da segnalare l'inusuale comportamento di questo individuo che si trovava in un campo arato aggregato ad un gruppo di Allodole *Alauda arvensis*.

La specie è rara e localizzata in Puglia, occasionale nel Salento.

Avvistamento invernale di Rondine *Hirundo rustica* nel Ferrarese (Emilia Romagna).

C. Bertarelli, A. Gelati, R. Gemmato e C. Giannella

Il 4 gennaio 1998 è stato osservato un individuo in volo sulle dune di Lido di Spina (Comacchio, FE).

La specie è presente in modo occasionale o comunque sporadico in inverno nelle regioni settentrionali. In Emilia Romagna è molto rara ed irregolare (es. 3 segnalazioni nel Modenese nel 1988-96, Giannella ined.). In Lombardia la presenza di 1-2 individui è quasi annuale sul Lago d'Iseo (P. Bricchetti e G. Ballerio, ined.).

Avvistamento di Calandro maggiore *Anthus richardi* nel Salento (Puglia).

G. Marzano

Il 15 novembre 1998 in contrada Jaddico (BR), a pochi chilometri dall'Adriatico, è stato osservato un individuo. La località è caratterizzata dalla presenza di estesi pascoli naturali, in alcuni tratti impantinati durante l'inverno e la primavera.

La specie è considerata migratore regolare in forma dubitativa (Bricchetti e Massa, 1998. Riv. Ital. Orn. 68: 129-152), in ragione dello modesto flusso di individui in transito nel nostro paese. In particolare nel Sud la specie sembra ancora più rara

Svernamento di Spioncello marino *Anthus petrosus* in Valle d'Aosta.

L. Ruggieri

Il 16 gennaio 1999 presso l'Invaso di Marais, piccola zona umida ai piedi del Monte Bianco a 900 m, è stato osservato un gruppo di 6 individui di questa specie.

Questi uccelli stavano pasturando sopra una piccola isola di limo in compagnia di uno Spioncello *Anthus spinoletta*.

La specie è stata recentemente separata da *A. spinoletta*. Le segnalazioni note finora sono 5, di cui una dalla Val d'Aosta nel 1891. Questa è l'unica avvenuta in pieno inverno.

Svernamento di Cutrettola *Motacilla flava* in Emilia Romagna.

N. Grattini e C. Sbravati

Un individuo è stato ripetutamente osservato dal dicembre 1998 al gennaio 1999 in località Tomina presso Mirandola (MO).

Recenti presenze irregolari di 1-4 individui sono note per la Sicilia mentre del tutto occasionali sono le osservazioni in Lombardia, Emilia Romagna e Marche.

Avvistamenti di Cutrettola testagiolla orientale *Motacilla citreola* in Friuli-Venezia Giulia.

T. Zorzenon

Tra il 10 ed il 18 aprile 1996 un individuo maschio è stato osservato presso l'Isola della Cona (Staranzano, GO). Un altro maschio è stato osservato il 21 aprile 1999 in località Lissert (Monfalcone, GO). Quest'ultimo individuo si trovava in compagnia di alcune Cutrettole *Motacilla flava* in una cassa di colmata in parte colonizzata da vegetazione alofita ed alberature sparse.

La specie è considerata accidentale per il nostro paese (Brichetti e Massa, 1998. Riv. Ital. Orn. 68: 129-152); queste osservazioni primaverili sembrano, però, confermare un limitato ed irregolare flusso migratorio della specie lungo la fascia costiera dell'alto Adriatico, così come proposto in forma dubitativa da Brichetti e Massa (1998).

Cattura di Cannaiola di Jerdon *Acrocephalus agricola* al Lago di Montepulciano (Toscana).

S. Lorenzoni e F. Pezzo

Il 10 ottobre 1998 durante una campagna di inanellamento presso il Lago di Montepulciano (SI) è stato catturato un individuo di questa specie.

Questa cattura testimonia la probabile presenza nel nostro paese di un flusso migratorio di questa specie, sconosciuta in Italia prima del 1995.

Presenze invernali di Cannaiola *Acrocephalus scirpaeceus* in Emilia Romagna.

F. Bonvicelli

Dal 27 febbraio al 14 marzo 1999 è stata osservata una Cannaiola in canto in località Valle Mandriole (RA). Si tratta di uno dei pochi casi di presenza invernale della specie nel paese (Nissardi, 1998. Riv. ital. Orn. 68:221-222).

Probabile nidificazione di Culbianco *Oenanthe oenanthe* sul Gargano (Puglia).

S. Laurenti e M. Zenatello

Il 30 maggio 1999 in un pascolo arido roccioso intervallato da radi alberi e arbusti posto a 880 m s.l.m. in località Coppa di Mezzo (S.Marco in Lanis, FG) è stata osservata una coppia di Culbianco (canto territoriale e parate nuziali).

Il periodo di osservazione e la territorialità degli esemplari fanno ritenere probabile la nidificazione di questa specie in un'area isolata dal punto di vista biogeografico, per la quale mancavano indicazioni di presenza in periodo riproduttivo.

Primo avvistamento di Tordo golanera *Turdus ruficollis* subsp. *ruficollis* in Italia.

D. Occhiato

Il 21 settembre 1999 è stato osservato alla foce del fiume Serchio (LU) un individuo maschio al 1° inverno di Tordo golanera (sottospecie "a gola rossa"). L'ambiente in cui è stato avvistato è caratterizzato da una folta macchia mediterranea retrodunale mista a boschetti di Pino marittimo *Pinus pinaster*.

Si tratta della prima osservazione italiana di questa sottospecie, esclusa quella avvenuta nel 1994, ma riferibile ad un'aufuga (Brichetti, Arcamone e COI, Riv. Ital. Orn. 1995).

Nidificazione di Tordela *Turdus viscivorus* al livello del mare in Puglia.

M. Zenatello

Il 2 giugno 1999 nel Parco della Villa Comunale di Trani (BA) sono stati osservati due giovani di Tordela, da poco involati, imbeccati a terra da un adulto. Nel

corso dell'osservazione è stato anche udito il canto di un maschio proveniente dagli alberi circostanti.

La nidificazione della specie al livello del mare non è finora mai stata riportata. Interessante appare inoltre la colonizzazione di un sito isolato a notevole distanza dalle aree appenniniche di nidificazione. Nidificazioni a quote di 100-200 m s.l.m. sono note per Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Nuove osservazioni invernali di Zigolo nelle nevi *Plectrophenax nivalis* in Puglia.

G. Albanese, E. Bruni, D. Cester, A. Magnani, L. Panzarin, L. Serra e M. Zenatello

Nei giorni 22 e 23 gennaio 1997, 8 Zigoli delle nevi sono stati osservati sugli argini delle vasche salanti della Salina di Margherita di Savoia (FG). Nella medesima area, il 9 gennaio 1999 è stato avvistato un gruppo di 12 individui.

Queste osservazioni confermano la presenza (regolare ?) di gruppi di individui di questa specie considerata molto rara in questa regione (Marzano e Panzera in Arcamone e Brichetti, 1997. Avocetta 21:220-227).

Svernamento di Averla piccola *Lanius collurio* in Toscana.

L. Colligiani

Il 3 e l'11 gennaio ed il 7 febbraio 1999 è stato avvistato un maschio di questa specie alimentarsi ad una mangiatoia in un giardino di Quarrata (PT). L'esemplare era in apparente buono stato di salute. Si dovrebbe trattare del primo caso di svernamento della specie in Italia.

Avvistamento di Crociere delle pinete *Loxia pytyopsittacus* in Piemonte.

L. Bordignon

Il 26 ottobre 1997 a Baudano di Trivero (BI) è stato avvistato un individuo posato su un abete rosso in compagnia di una ventina di Crocieri *Loxia curvirostra*.

Si tratta della 14° segnalazione per l'Italia, la prima per il Piemonte. L'arrivo di questo individuo è da correlare ad un eccezionale invasione di crocieri registrata in quell'anno.