

MARIO MARIANI

# GLI UCCELLI DI SICILIA

*CON DIZIONARIO SICILIANO-ITALIANO*

*DELLE SPECIE ANCHE ACCIDENTALI*

*(Disegni di Raniero Alliata di Pietratagliata)*

PALERMO - SCUOLA TIP. BOCCONE DEL POVERO

1942 XX

Un milione di anni fa ai primi albori dell'umanità, l'uomo dell'epoca glaciale contemporaneo del Mammut e abitatore delle caverne, si aggirava nelle foreste armato soltanto dei suoi artigli, dei suoi denti e di qualche pietra malamente appuntita. In queste condizioni, costretto a lottare coi suoi mezzi naturali contro il terribile *Ursus spelæus* che gli contendeva la caverna, in continua lotta contro gli elementi, egli non poteva considerare la bestia se non come una preda ed un nemico.

Egli non sospettava che la sua Specie si sarebbe impadronita della terra, e che avrebbe sopraffatto tutte le altre Specie animali con la forza della sua intelligenza.

La intelligenza di quel nostro antichissimo antenato doveva certo somigliare a quella di un moderno bambino dell'età di tre o quattro anni e come questo, ancora in preda agli impulsi istintivi, non poteva amare le bestie e sarà stato crudele con esse.

Oggi che l'uomo si è reso padrone non soltanto della terra e delle acque del suo pianeta ma altresì dell'involucro atmosferico che lo avvolge; oggi che attraverso complicate elaborazioni cerebrali e con l'immenso occhio dei suoi telescopi si spinge a frugare negli abissi cosmici, e con gli spettroscopi analizza e pesa astri lontani a centinaia di anni-luce; oggi l'uomo non teme più la bestia e vede con dolore l'estinguersi di belle specie da carne e da pelliccia perseguitate dai cacciatori e soprattutto dai bracconieri. Si rende conto che l'equilibrio naturale va turbandosi a causa della millenaria abitudine a predare e cerca di correre ai ripari.

Sebbene ciò possa, a tutta prima, sembrare strano è proprio nei cacciatori che noi troviamo gli zoofili più appassionati; essi tendono ad organizzarsi, a regolare la passione venatoria, a rispettare i nidi, i giovani animali e le Specie durante il periodo della riproduzione.

Il cacciatore ama le bestie e non soltanto dal punto di vista venatorio. Egli non può sottrarsi dall'ammirare le piccole e le grandi meraviglie che cadono sotto i suoi occhi durante le sue peregrinazioni.

Egli vi parlerà dunque di farfalle, di scarabei ammirati e cercherà di descriverle: è un ottimo osservatore il cacciatore e come tutti gli osservatori intelligenti è curioso e sarà lieto se potrà imparare a conoscere i nomi degli uccelli, dei rettili e de-

gli insetti che egli ha osservati. Ecco uno dei punti in cui la zoofilia va verso la zoologia.

### III.

Prima del Linneo non esisteva ancora una zoologia vera e propria, pur non mancando gli zoofili ed i filosofi naturalisti.

Allora le bestie, eccettuate le più comuni, si distinguevano le une dalle altre, non con un nome, ma con un giro di parole rappresentante una sommaria descrizione. Ricorderò qui fra i naturalisti siciliani contemporanei di Linneo l'illustre scienziato Francesco Cupane autore del «Panphiton Siculum» e di altre opere contenenti numerose descrizioni e disegni di animali e di piante della Sicilia.

Ma tutti gli sforzi fatti dagli uomini di ingegno che precedettero Linneo furono vani e la zoologia cominciò la sua vera esistenza con l'applicazione della nomenclatura binomiale e la classificazione naturale da lui introdotta.

La zoologia sistematica è la forma più atta a compendiare lo stato al quale è giunta la scienza essendo la classificazione zoologica il risultato complessivo di ricerche morfologiche, anatomiche e biologiche; essa ha un duplice ufficio:

I. — Costruire un catalogo completo degli animali esistenti sulla terra assegnando a ciascuna Specie un nome proprio che serva a distinguerla dalle altre unità del medesimo gruppo e descrivendo, oltre che la forma ed il colore, anche il modo di vivere degli animali.

II. — Raccogliere i risultati dell'anatomia, della fisiologia, della embriologia e della panteologia per ricavare dalla loro sintesi quelle nozioni che valgono a far conoscere le reali affinità esistenti fra i gruppi animali allo scopo di andare alla loro genesi.

Queste ricerche filogenetiche sono il più alto fine della zoologia, esse appagheranno in un tempo più o meno lontano il nostro sconfinato desiderio di conoscere la provenienza delle cose che ci circondano e la nostra stessa provenienza fisica.

I più recenti studi di zoologia sono ispirati proprio alla filogenia e alla zoogeografia.

Quest'ultimo studio prefiggendosi di dividere gli animali in elementi faunistici abitanti le diverse regioni della terra per stu-

diarne i fenomeni di diffusione è anch'esso un mezzo per arrivare alla genesi.

Nell'esporre molto sommariamente gli scopi della zoologia ho voluto mettere in rilievo la importanza che ha la determinazione della Specie che si osserva. Quello che potrebbe sembrare a prima vista una questione puramente informativa è invece un elemento fondamentale.

Sarebbe una stoltezza osservare per ore ed ore le interessanti abitudini di un animale senza conoscere il suo posto sistematico ed il suo nome scientifico, o meglio senza cercare di conoscerlo; sarebbe come disperdere al vento un tesoro per impedire agli altri di poterne godere; sarebbe insomma una frode alla scienza. Purtroppo la schiera dei sistematici va facendosi in Italia sempre più rada. Questo fenomeno dipende assai probabilmente dal dinamismo attuale ed io sono certo che fra gli zoofili italiani, massime fra quelli che il bisogno non spinge, molti zoologi vi sarebbero; occorre solo un indirizzo per questi ammiratori della natura.

Mettete sotto gli occhi dello zoofilo gli animali in serie ben ordinate spiegategli il meccanismo della classificazione, fategli osservare le meraviglie che lo scalpello anatomico mette in evidenza, mettete sotto i suoi occhi le meraviglie che rivela il microscopio ed avrete messo il seme per un futuro zoologo: uno di più da aggiungere alla piccola ma bella schiera degli Zoologi Italiani.

#### IV.

Così ho deciso, aderendo al desiderio di molti cacciatori, di compilare questo opuscolo sugli uccelli, per i cacciatori Siciliani, sistemandolo non come un dizionario, ma come un elenco faunistico scientifico corredato di un dizionario indice, dei nomi comuni italiani e dialettali siciliani, che possa servire di guida per la determinazione di ciascuna specie, inquadrata nella propria famiglia, in base alla sola conoscenza del nome dialettale. Se poi si volessero conoscere tutti i nomi dialettali di una determinata specie, della quale si conosce il nome scientifico, basta scorrere sulla numerazione dell'indice fino a trovare tutti i numeri corrispondenti a quello della specie cui si riferiscono. Per raggiungere

lo scopo prefissomi ho consultato numerosi dizionari siciliani, opere in gran parte introvabili, se non nelle biblioteche, e delle quali ho compilato un breve indice bibliografico.

Ringrazio tutti i cacciatori che hanno voluto darmi notizie sui nomi dialettali ed altre utili indicazioni e specialmente il mio amico Luigi Buscemi da Enna dal quale ho attinto preziose informazioni.

## V.

Nella compilazione del testo ho usato alcune abbreviazioni la cui lettura è facilitata da un segnalibri indice.

Sono preceduti da un (\*) le specie appartenenti alla selvaggina stanziale protetta; da un \* le specie di puro interesse venatorio; da due \*\* le specie delle quali è vietata la caccia; da (\*\*\*) le specie utili all'agricoltura; da tre \*\*\*\* le specie dannose all'agricoltura, alla selvaggina, e infine da (\*\*\*\*) quelle dannose alla piscicoltura.

Di ciascuna Famiglia ho descritto brevemente i caratteri che, come è noto, per gli uccelli, si riferiscono specialmente alla morfologia del becco, e dei tarsi.

## INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

- (\*) Selvaggina stanziale protetta.
- \* Specie di interesse venatorio.
- \*\* » delle quali è vietata la caccia.
- (\*\*) » utili all'agricoltura e da proteggersi.
- \*\*\* » dannose all'agricoltura ed alla selvaggina.
- (\*\*\*) » dannose alla piscicoltura.
- A. Cattura accidentale.
- C. Specie comune.
- Ca. » comunissima.
- E. » estiva.
- I. » ibernante.
- L. Laghi, stagni e paludi.
- M. Monti.
- P. Specie di passo.
- Pi. » » » irregolare.
- Po. Pianure.
- R. Specie rara.
- S. » stanziale.

I numeri romani che seguono la lettera P. indicano i mesi dell'anno in cui le specie passano dalla Sicilia; quelli che seguono le lettere I. ed E. indicano il mese di arrivo e quello di partenza delle specie ibernanti ed estive.

I nomi volgari italiani sono scritti in corsivo.

Le indicazioni di località capiluogo di Provincia indicano la presenza delle specie in tutta la Provincia.

## DIZIONARIO SICILIANO - ITALIANO

(i numeri che seguono i nomi indicano il progressivo della specie nel Catalogo)

Àbbia Gabbiano comune	238	Àculania Biancone	143
Abbiùni » reale	233	Àculoccia »	143
Abbiùni Gavianà	234	Àculotta Aquila del Bonelli	132
Abbùni Gabbiano comune	238	Addazzu Beccaccia	222
Acchiappa-muschi Pigliamosche	60	Addinazza Folaga	254
Acéddu cavaleri Cavaliere d'Italia	218	Addinedda Fratino	200
» celesti Martin-pescatore	112	Addinedda d'acqua Porciglione	246
» di S. Giovanni niuru Merlo		» múnaca Corriere pic-	
acquaiuolo	101	colo	199
» di S. Martinu Martin-pe-		Adduzzu d'acqua pedi verdi Vol-	
scatore	112	tolino	247
» » tempesta Uccello delle		Adornu Falco pecchiaiolo	142
tempeste, Procellaria	183	Aggerinu Fringuello	23
» múnacu Gazza	6	Aggruppa-filu Rigogolo	13
» paléddu Spatola	150	Àiba scieru Gabbiano comune	238
» parrinu Berta maggiore	186	Àipa v. Caipa »	238
» parrinu nicu Tuffetto	188	Aipazza v. Caipazza	
Aciddázza barbatu Avvoltoio de-		Aipedda v. Caipedda o Gaipedda	
gli Agnelli	144	Aipedda v. Caipeddu o Gaipeddu	
» biancu Cicogna bianca	148	Aipotta grisciu Gabbianello	237
» di notti Gufo reale	120	Aipúni v. Caipúni	
» di passa Capovaccaio	145	Airuneddu biancu Gazzetta	154
Aciddúzzu d'acqua Corriere piccolo	199	Airúni iaucu 'mpiriáli Sgazza	155
» di buona nuova Cannaiola	69	» » nicu Gazzetta	154
» di caccia nova Canna-		» ciannirinu Airone cenerino	152
reccione	68	» tunisiu »	152
» di cannitu Rusignuolo		Aiuculáccia Aquila del Bonelli-	
di fiume	67	Biancone	132 143
» di fava Sterpazzola	73	Àiula Rigogolo	13
» di favari Sterpazzola		Aiulidda bianca Fraticello	231
di Sardegna	75 bis	Àiula Rigogolo	13
» di fienu Beccamoschino	78	Alalóna Rondine di mare	230
Aciddúzzu musea Sericciolo	100	Ala-longa a pedi russi Mignattino	
» piscaturi Martin pesca-		ali bianche	227
tore	112	» » di li picculi Fraticello	231
Àcula Aquila in genere	132	» » nica »	231
Àculaccia Biancone	143	» » nica Mignattino	226

Ala-lunga niura pedi russi Mignatino ali bianche	227	Anitra di màlu tempu Uccello delle tempeste	183
» » pedi e pizzu niuru Bec-capesci inglese	227bis	» di fischin Fischione	170
» » tuppata Beccapesci	229	» domenicana Quattrocchi	177
Ala pinta Balia dal collare	62	» fia Fischione	170
Albanedda di passa Lodolaia	128	» fischiatrici Fischione	170
» perdi-iurnàta Capovaccaio	145	» fischiani imperiali Germano turco	173
Albaneddu Falco pellegrino	126	» franciscana Moriglione	174
» càusi russi Falco cuculo	129	» » occhi bianchi	
» cinnirusu Albanella minore	138	Moretta tabaccata	175
» di passaAlbanella reale	137	» friscalora Fischione	170
» jancu » »	137	» fungiuta Mestolone	172
» miula Pojana	134	» ianca Volpoca	165
» raru Albanella pallida	136	» imperiali bianca cu pizzu annascatu Volpoca	165
Albanieddu v. Albaneddu		» maltisa »	165
Alipinti Balia dal collare	62	» mascaruni Gobbo rugginoso	178
» niuru Balia nera	61	» occhi lucenti Moretta tabaccata	175
» testa niura Capinera	72	» palituni Mestolone	172
Alituni Pojana	134	» seavuni Moriglione	174
Alloccu Allocco	124bis	» serra Smergo minore	179
Ammazza-cani Piviere dorato	201	» sietta »	179
Ammecca-muschi Pipliamosche	60	» tacchiata Canapiglia	169
Amararu Sterpazzolina	75	» testa di tureu Germano turco	173
Anatra v. Anitra		» tistuni Gobbo rugginoso	178
Anfia Fischione	170	» tuppata Moretta	176
Anigghiu ianen Albanella pallida	136	» turca Germano turco	173
Anitra Germano reale	166	Apaluóru Gruccione	109
» azzutaturi Svasso maggiore—Strolaga minore	186 189	Appappa-muschi o Appappamuschi Pigliamosche -- Lui piccolo -- Cannareccione	60-63-68
» azutaturi granni Strolaga minore	186	» muschi iancu Lui bianco	65
» bianca cu l'ali niuri Quattrocchi	177	Appéccchia Falco di palude	135
» coddu russu Moriglione	174	» ianca Albanella reale	137
» cruciata Volpoca	165	Appègghia Albanella minore	138
» cucchiaruni Mestolone	172	Appizza-ferru Gruccione	109
» euda longa Codone	171	Aquilotta Aquila del Bonelli	132
» eudata »	171	Arbanedda ianca Albanella reale	137
» di S. Pietru »	171		



Arbaneddu v. Albaneddu		Barcaluòro Nibbio reale	140
Arcirotta Beccaccino reale	223	Bardante Berta maggiore	185
» di turdi Pittima minore	219	Bària Balia nera	61
» imperiale »	219	Beccaccinedda Frullino	225
Arcirottèdda o Arciuttèdda Frullino	225	Beccaccinu »	225
Aretta Garzetta	154	» di li picciuli Frullino	225
» biunna Sgarza ciuffetto	157	» di sciumàra Piro-piro boschereccio	216
Ariuncèllu Garzetta	154	» 'mpiriali Croccolone	224
Ariùni biancu Airone bianco	155	» iammi longhi Albastrello	212
Aroi Gru	244	» riáli Pettegola	213
Aroi iancu Airone bianco	155	» surdu Frullino	225
Arpa Grifone	146	» tringni Calidra	210
Arpazza »	146	Beccácciu Beccaccia	222
Arpècchia Falco di Palure	135	Beccaficu Beccafico	71
» ianca Albanella reale	137	» di caannitu Cannaiola	69
» di passa Falco pecchiarolo	142	» di cerza Luí piccolo	63
Arpèggia Falco di palude-Albanella minore	135 138	» di màrgiu Cammaiola	69
Arpia Falco di palude	135	» di máin »	69
Arpiuni »	135	» 'mpiriali Codirrossone	85
Arùni Airone cenerino	152	Beccamúschì Luí piccolo	63
Auciddazzu di notti Gufo reale	120	Beccu duru Frosone	14
» di passa Capovaccaio	145	» grossu »	14
Aucidduzzu di paradisu Martinpescatore	112	» russu Pernice di mare	197
Auggia cu filu Rigogolo	13	» tortu Piovanello	205
Auriòlu »	13	Beverotta Fratino	220
Azzetta bianca Garzetta	154	» di maisi Piviere dorato	201
» 'mpiriali bianca Airone bianco	155	Bianculidda Beccafico	71
Azzutatori granni Svasso maggiore	186	Bittòrda Tarabuso	160
» media di mare Svasso piccolo	187	Bofuscu Capinera	72
» nìcu Tuffetto	188	Brancialóru Picchio muratore	52
		» a beccu tuortu Rampichino comune	50
		Briviéri Sparviere	139
		Brúbula Upapa	110
		Buarázza Gabbiano reale	233
		Buceazza Pojana	134
		Búfòlo Cucúlo	118
		Butórnù Tarabuso	160
		Butúru Grifone	146
		» di Gaddazzi Airone cenerino Tarabuso	152 160
Balestruzzu Balestruccio	103		
Barbaiànni Barbagianni	125		
Barbóttula Balestruccio	103		

**B**

Bátura niuru Avvoltoio	147	Caipa o Aipa tringni Gabbiano	
Buzzacchinu Pojana	134	tridattilo	239
Buzzacchinu »	134	Caipazza Beccapesci maggiore	228
		Caipédda ianca Fraticello	231
		» niura Mignattino	226
		» testa niura Mignattino	
		ali bianche	227
		Caipéddu niuro Mignattino	226
		Caipúni Gaviana	234
		» grossa Gabbiano reale	233
		Calàndra Calandra	37
		Calàndredda Calandrino	38
		» d'arvulu Totavilla	40
		Calàndrùni Calandra	37
		Calannirèdda Calandrino	38
		Calannulùni Calandra	37
		Capomavizzo Tordela	81
		Cappuccina Lanario	127
		Cappuzzièddu Cappellaccia	39
		Capafùscu Balia nera, Capine-	
		ra	61.72
		» eu Poechi russi Occhio-	
		cotto	74
		» granni Capinera	72
		Capúni d'acqua Tarabuso	160
		» di pantunu »	160
		Capunièddu Sgarza ciuffetto	157
		Caputórtu Torcicollo	117
		Capurassu Moriglione	174
		Caracéfalu Averla capirossa	57
		Carannileddu Calandrino	38
		Carannula Calandra	37
		Canniluni »	37
		Carbuunaru Passera scopaiola	99
		Carcaràzza Gazza	6
		» di mari Ghiandaia	
		marina	111
		Carearazedda Balia nera, Balia	
		dal collare	61-62
		» niura Gazza	6
		Carcarazeddu Averba capirossa	57
		Cardiddu Cardellino	16
		Cardillino Cardellino	16

Carnaggiàu Ghiandaia, Ghian- daia marina	7 111	Ciàvula grigia Cornacchia grigia	2
Carpiddina Cappellaccia	39	Ciàvula maltisa Cornacchia grigia	2
Carpinteri Picchio rosso mag- giore	114	» tunisina Gracchio corallino	8
Carrabaru Codone	171	Cicchitedda Occhiocotto	74
Carrabbiddúzza Beccamoschino	78	Cicedda Fringuello	23
Carragiàu Gazza, Ghiandaia ma- rina	6-111	Cicirru Strillozzo	28
Carragiò Ghiandaia marina	111	Ciciruni »	28
Carraru »	111	Cicogna bianca Cicogna bianca	148
Carrubbeddu Beccamoschino	78	» » 'mperiali Airone bianco	155
» niuru Monachella nera	90	» nira o niura Cicogna nera	149
Cascasciarra Culbianco	87	Cicugnetta Sgarza ciuffetto	157
Catazzumulu Smergo minore	179	Cicugniddúzzu Nonnotto	159
Cattrocòscie Albanella minore	133	Cicùla Ghiandaia	7
Cavalèri Cavaliere d'Italia	218	Ciggu selvaticu Cigno selvatico	162
Cavalirotta Pettegola — Panta- na	213-214	Cillú Mignattino ali bianche	227
» nira Totano moro	211	Cinnu v. Ciggu	
Cazzicaventulu Beccapesci mag- giore	128	Ciricàca Gazza	6
Cazzaventu Fraticello	131	Cirincià o Cirinciò Cianciallegra	53
Ceca Beccaceno reale	223	Cirricàca Ghiandaia, Ghiandaia marina	7-111
Cerniventu Gheppio	131	Cirrichiàpoli Rondone alpino	106
Chiavitteri Cinciallegra	53	Cirriottu Chiurlottello	221
Chiò-chiò Fanello	18	Cirriviu Occhione	195
Chiù Assiolo	121	Cirriu »	195
Chiummalòru Passera scopaiola	99	» niuru Mignattaio	151
» muntanaru Sordone	98	Cirrotta Alzavola	167
Chiumminu Falco cucùlo	129	Cirru Gabbiano corallino	235
Chiùppu Assiolo	121	Cirulli Chiurlo maggiore	220
Chiúzzu »	121	Cirzotta Alzavola	167
Cialedda Gazza	6	Ciacélla Colombella	191
Ciàula Taccola, Ghiandaia ma- rina	4 111	Ciarlaviotta Chiurlottello	221
» cu pizzu rissu Gracchio co- rallino	8	» niuru Mignattaio	151
» piamuntisa Corvo nero	3	Ciarlavuni niuru »	151
Ciàvula Taccola	4	Ciarrù Occhione	195
» di campanaru Taccola	4	Ciarrù »	195
» cu lu pizzu rissu Grac- chio corallino	8	Ciarruni »	195
		Ciarruvia »	195
		Còcciu di campa Martin-pescatore	112
		Coddu tortu Torcicollo	117
		» viridi Germano reale	166
		» niuru Quaglia tridattila	257
		Codidda ianca Balestruccio	103

Cola Taccola	4	Cuccu Gufo comune	122
Cornacchia Taccola	4	» di passa Allocco di palude	123
Corvetta Corvo nero	3	Cuccù africanu Bubbola	110
Corvu Corvo imperiale	1	» di passa Cuculo	118
» caragiàiu Ghiandaia	7	» tappùtu Cuculo col ciuffo	119
» en i pedi russi Gracchio	9	» bidda Cuculo	118
» di mari Marangone	180	Cuccuni Gufo reale	120
» di notti Nitticora Maran- gone	158-180	» di passa Gufo di palude	123
» di passa Corvo nero	3	Cucù Cuculo	118
» di sinteri »	3	Cuccciata o Cuccciata Cappel- laccia	39
» iàneu Cornacchia grigia	2	Cucugghiata Cappellaccia	39
» imperiali Corvo imperiale	1	Cucugghiàtula Totavilla	40
» marinu Cornacchia grigia	2	Cuda bianca Culbianco	87
» marinu tapputu Marangone col ciuffo	181	» bianca furastera Monachella	88
Cristarèdda Gheppio	131	» di focu Codiroso comune	93
» fimminàra Albanella reale	137	» di focu barbarisca Codiros- sone	85
» frusteri Falco grillaiu	130	» » pettu niru Codiroso spazzacamino	94
Crivedda Gheppio	131	» » di livanti Codiroso	85
Cròi Gru	244	» ianca en l'ali niri Monachel- la a gola nera	89
Cruciata Volpoca	165	» longa o Cudalunga Codone	171
Crusulèu Rigogolo	13	» russa Codiroso	85
Cruvèchia Corvo imperiale	1	» » ciunirusa Codiroso spazzamino	94
Cucca Civetta	124	» » carbonara o carvunara Codiroso spazzacamino	94
» di màiu Cucùlo	118	» » a pettu brù Petto az- zurro a macchia bianca	96
» di passa Allocco, Falco cucùlo	124 bis 129	» » a pettu niru Codiroso spazzacamino	94
» di rocca Assiolo	121	» » di rocca Codiroso spaz- zacamino	94
» di ruccaru »	121	» » faccia bianca Codiroso comune	93
Cuccaredda Falco cucùlo	129	» » vavarisca Codiroso spazzacamino	94
Cuccarella Assiolo	121	» » vranca Culbianco	87
Cuccaredda »	121	Cudirassuni Codiroso	85
Cuccazza Allocco di palude	123	Culócchia Aquila del Bonelli, Aquila la minore, Falco di pa-	
Cuccazzu Assiolo	121		
Cucchiaredda Spatola	150		
Cucchiàrunedda Mestolone	172		
Cucciaruni »	172		
» mōnacn »	172		
Cùccia Cappellaccia	39		
Cucciaruni Mestolone	172		
Cuccivvia Cappellaccia	39		

Inde	132	133	135	glio	128 bis
Culubianeu o Culianeu	Culbianco	87	Falcuni	smidigghiu o smirigghiu	
Cuòcciu di càmula	Martin pescatore	112		Falco Smeriglio	128 bis
Cuoddu viridi	Germano reale	166	»	di malta Falco grillaio	130
Corvu v. Corvu			»	piddirinu » pellegrino	126
Curdàru	Succiacapre	108	»	raru Lanario	127
Curidda ianca	Culbianco	87	Fanellu	Fanello	18
»	» en l'ali niuri Monachella a gola nera	89	Farchettu	Lodolaia, Sparviero	129 139
»	» unachedda Monachella	88	Farcunàzzu	Biancone	143
» russa	Codirosso comune	93	Farcuni o Falcuni	Falcopellegrino Pojana	126 134
»	» rara Codirosso spaz-zacaminu	94	»	biancu Albanella reale	137
Curnàcebia	Cornacchia grigia	2	»	di passa Lodolaia	128
Curnacciu	»	2	»	frusteri Falco cucùlo	129
Curnutteddu	Gufo comune	122	»	iancu Falco pecchiaiolo	142
Currintinu o Currintuni	Calandru	42	»	palummu Falco cucùlo	129
Curripràia	Corriere piccolo	199	»	raru Lanario	127
»	picciulu Fratino	200	»	viddaru Lodolaia	128
»	granni Corriere grosso	198	Farcunieddu biancu	Albanella reale	137
Curriviòla	Cappellaccia	39	»	» raru Albanella pallida	136
Curvacchin	Cornacchia grigia	2	Fasciana		
Carvettu piamuntisi	Corvo nero	3	Fascianedda	Porciglione	246
			Fasciànu d'acqua	Pollo sultano	252 253
			Fassa	Colombaccio	192
			Faunazzu di rocca	Gufo reale	120
			Favaiàna	Marzaiola, Mestolo-	
Ervalòra	Canapiglia	169	ne		168 172
			Favarotta	Sterpazzola	73
			Ferrarèddu	Passera scopaiola	99
			»	muntanaru Sordone	98
Facci d'omu	Gufo reale	120	Ferraru	»	98
Facciòla	Folaga	254	Fiammanti	Fenicottero	161
Faciànu	Pollo sultano a schiena verde, Pollo sultano	252-253	Fiammingu	»	161
Faganu	Barbagianni	125	Fici-fici	Luà piccolo	63
Fagianedda	Frullino	225	Filomèla o Filomèna	Usignuolo	95
Fagiànu biancu	Barbagianni	125	Finicóttiru	Fenicottero	161
Falchettu maltisi	Falco grillaio	130	Firmicularu v. Furmicularu		117
Falchiettu	Sparviero	139	Fischinni	Fischione	170
Falcu palummu	Falco cucùlo	129	Fiti	Pispola	44
Falcunàzzu	Biancone	143	Fitusèddu	Procellaria a coda for-	
Falcuni di rocca	Falco Smeri-		cuta		184
			Fòggia	Folaga	254

Forbiciùni Nibbio reale	140	Gaddinedda di boscu Mignattaio	251
Forficia »	140	» imperiàli »	251
Forgia Folaga	254	» marzudda Voltolino	247
Forgiaredda Gallinella d'acqua	251	» pedi viridi Mignattaio	251
Formicàru Torcicollo	117	» pizzu giarnu »	251
Francisòtta Cavaliere d'Italia	218	» surcera di li grossi Schi-	
Fratascià Magnanina	76	ribilla	248
Fringuella Fringuello.	23	» » di li piccioli	
Friscuni Fischione	170	Schiribilla gri-	
Fuànu Gufo comune, Alloc-		giata	249
co	122 124 bis	» seaccia mágina Piro-pi-	
» di maisa Gufo di palude	123	ro boschericcio, Schi-	
Fuganu Gufo comune, Alloc-		ribilla	216 248
co	122 124 bis	Gaddinazza Porciglione	246
Fuganazzu Gufo reale	120	Gadda fasciànu Pollo sultano	252 253
Fuianazzu »	120	» imperiàli granni di lagu To-	
Fuiànu Allocco	124 bis	tano moro	211
Fuliàru Averla piccola	59	Gaddu-foddi Succiacapre	108
» cinnirusu » cenerina	58	Gadduzzeddu Gambecchio, Gam-	
Furficiùni Nibbio reale	140	becchio nano	207 208
Furmiculàru Torcicollo	117	Gaddazzu Rusignolo di fiume, Pi-	
Furria Zucchi Picchio muratore	52	ro-piro piccolo	67 217
Furticchin Cinciallegra	53	» ciarlavi Piovanello pan-	
» picciula Cinciarella	54	cia nera	206
Fusaddiu Cinciallegra	53	» d'acqua Merlo acquaio-	
» picciula Cinciarella	54	lo, Piro-piro, pic-	
Futicàru Averla piccola	59	colo	101 217
		» di gammi russi Alba-	
		strello	212
		» di li grossi Piro-piro	
		culbianco	215
		» di li piccioli Piro-piro	
		piccolo	217
		» di li pinti » » bo-	
		schereccio	216
		» di li nichì Piro piro pic-	
		colo	217
		» di mari Piovanello, Pio-	
		vanello pancia	
		nera	205, 206
		» » piccioli Piova-	
		nello, Piovanel-	
		lo pancia nera	206

G

Gabrieli Rigogolo	13
Gaddarann Mignattaio	151
Gaddazzu Beccaccia	222
» carisi »	222
Gaddina di massaria Gallina pra-	
taiola	243
» petraiòla Gallina prataiola	243
» pizzorna Porciglione	246
Gaddinazza niura Folaga	254
Gaddinedda d'acqua Porciglione,	
Mignattaio	246 251
» d'acqua surciera Schi-	
ribilla	248

Gadduzzu di mari picciulu Piovanello, Piovanello pancia nera	205 e 206	Gargana Averla maggiore	59 bis
» imperiáli Albastrello	212	Gaudiu Rigogolo	13
» » di sciúmi Piro-piro boschereccio	216	Gazza ladra Gazza	6
» 'mperiali gammi lunghi Albastrello	215	Gentilomu Corrione biondo	196
» sucida tui-tui Piro-piro culbianco	215	Ghiummalóru Passera scopaiola	99
» triúgni Calidra	210	Giái o Giáiu Ghiandaia	7
Gaipázza Gabbiano reale	233	Giáiu	7
Gaipázza pizzu grossu russu Beccapesci maggiore	228	Giallinedda Ballerína gialla	47
Gaipèdda Fraticello	231	» di primavera Cutrettola del Ray	46
Gaipèddu Mignattino ali bianche	227	» testa nira Cutrettola capinera	45
» niuru Mignattino	226	Giáiu Ghiandaia	7
» tupputu cu pizzu longu niuru Beccapesci	229	» marinu Ghiandaia marina	111
Gaipuni triúgni Gabbiano tridatilo	239	Gióppu Assiolo	121
» grossu cu l'ali cinnirusi Gabbiano reale	233	Girbina Marzaiola	168
Gáiu o Gáiu Rigogolo	13	Giriúni Cucúlo col ciuffo	119
Gaiulidda Beccapesci	229	Giummaloru Passera scopaiola	99
» bianca Fraticello	231	Grassotta janca 'mpiriali Airone bianco	155
Gallaránu Mignattaio	151	» bianca Garzetta	154
Gambetti pedi lunghi Cavaliere d'Italia	218	Grassottu Sgarza ciuffetto	157
Gammetta Combattente, Pantana	209	» imperiáli Airone cenerino, Nitticora	152 158
» nira Totano moro	211	Grifuni Grifone	146
» gammi longi Albastrello	212	Grisciu Alzavola	167
» giorára Piviere dorato, Pettegola	201 213	Groi Gru	224
» imperiáli Pittima minore	219	Guagghiarina Calandrino	38
» pedi lunghi Cavaliere d'Italia	218	Gufu Gufo comune	122
Gammi lunghi Cavaliere d'Italia	218		
Gamina Combattente	209		
Ganácciu Airone cenerino	152		
		<b>I</b>	
		Iacóbbu o Iacóbu Assiolo	121
		Iacuópu	121
		Iaddazzu Beccaccia	222
		Iaddinazza d'acqua Folaga	254
		» niura	254
		Iaddinazzu niuru Folaga	254
		Iaddinedda d'acqua Gallinella d'acqua	251
		» d'acqua cu li piéri giarni Schiribilla grigiata	249
		» d'acqua cu li piéri verdi	
		Voltolino	247

Iaddinedda d'acqua sureiéra o surerà		so mezzano	115
Schiribilla	248	Linguinèdda cantatùra Pispolone	43
Iaddu fascianu Pollo sultano	252 253	» d'erva Pispola	44
Iadduzzèddu d'acqua Corriere		» surda Totavilla, Pispolone	40 43
» » en li pedi	198	Lòcustana	218
giarni Schiribilla grigiata	249	Lòdana Allodola	41
Iaddúzzu d'acqua Schiribilla, Gallinella d'acqua, Piro-piro piccolo	248 251 217	» cantatùra Pispola	44
» 'mpiriàli Gallinella d'acqua	251	» cieiruni Allodolo	41
Iàmmi luòngghi Cavaliere d'Italia	218	Lòdina pispisa Calandra	42
Iamminu Gambetta	209	Lòdona tuppata Cappellaccia	39
» riàli Pantana	214	Lòdula Allodola	41
Ianculiddu Beccafico	71	» di mari Gambecchio	207
Iannàzzu Airone cenerino	152	» tuppata Cappellaccia	39
Iànni » »	152	Lònara Allodola	41
» 'mpiriàli biancu Sgarza	155	» cantatùra Totavilla	40
Iardinàru Ortolano	32	Lòndria Totavilla	40
» pettu russo Zigolo nero	31	Lucàru Lucarino, Gufo reale	17 120
Irbalòra o Irbalòra Canapiglia	169	Lucirtuni Marzaiola	168
Iuduni Colombaccio	192		
Izzu Gheppio	131		
» di passa Falco cucùlo	129		
		<b>M</b>	
		Maiolina Piovanello	205
		» nica Gambecchio, Gambecchio nano	207 208
		Maisòlu Piviere dorato	201
		Malbizzu o Malvizzu Tordo	80
		» pettu russu Tordo sassello	82
		Malvizzuni Tordela	81
		Mamma nivirèdda Gallina prata-iola	243
Lagòrnia Falco pecchiaiolo	142	Mancia alivi Cinciarella	54
Lauriddu Rigogolo	13	» api o lapì Gruccione	109
Lavòrnia Falco pecchiaiolo	142	» musehi iancu Luà bianco	65
Lavuratùri Smergo minore	179	» farmiculi Torcicollo	117
Lècuru Lucarino	17	» iaddini Sparviero	139
Lèsina Avocetta	218 bis	» pisci Gabbiano Reale	233
Len Allocco di palude	123	» seechi Grifone	146
Librazzinu Occhione	195	Maranguni Marangone	180
Lìcaru o Lìcaru Lucarino, Gufo reale	17 120	Maravizzaru Falco grillaio	130
Lingua longa Torcicollo	117	Maraòne o Marauni Marangone	180
» » en lu pinnacchièddu russa Picchio rosso maggiore	114	» » tuppata Marangone col ciuffo	181
» » di turdi Picchio ros-			



Marguneddu Tuffetto	188	Mèrgu Marangone	180
Margùni Marangone	180	Merlu Merlo	84
» svàriu Marangone col ciuffo	181	Merra Merlo	84
Marinaredda Corriere piccolo	199	» d'acqua	101
» granni Corriere grosso	198	Merru Merlo	84
Marinedda Colombella	191	» a collana Merlo col petto bianco	83
Marranzanu Porciglione	246	» di passa Merlo acquaiuolo pancia nera	85
» pedi viridi Voltolino	247	» di rocca Passero solitario	86
Martèddu Piviere tortolino	200 bis	» di sciàra Merlo	84
» riàli Piviere dorato	201	» di sipàla »	84
» nièu Corriere piccolo	199	» niuru »	84
Martiddùzzu Balestruccio, Ron- dine montana	103 105	» pettu iancu » col petto bianco	83
Martin piscatùri Piombina	112	» vavariscu merlo col petto bianco	83
Martinedda »	112	Mierru solitariu Passero solitario	86
Marvizza Tordo	80	Miliùni Nibbio reale	140
» furastera Tordo sassello	82	Minùtula Sordone	98
» riàli Tordela Gazzina	79	» veru Fanello	18
Marvizzo imperiali » »	79	Mitarda Alzavola	167
Marvizzu Tordo	80	Miùla Poiana	134
» di passa	83	Mmùcca-muschi Lui piccolo	63
Marvizzuni Tordela	81	» » iancu » bianco	65
Marzaiòla Marzaiola	168	Modda Spatola	150
Marzola »	168	Moja o Moju Moriglione	174
» testa nira Gabbiano coral- lino	235	Morta riàli Svasso maggiore	186
Marzolina Marzaiola	168	Mòschitu Lui piccolo	63
Marzudda Marzaiola	168	Mulinàru Averla piccola	59
Muscaruneddu »	168	» cinnirusu Averla cenerina	58
Masculino Grifone	146	» cu la testa russa Averla capirossa	57
Mataccinu o Mattucinu Culbianco	87	» grossu Averla cenerina	58
» cu l'ali niuri Monachel- la gola nera	89	» picciulu Averla capirossa	57
Mataccinu iancu Monachella	88	Munacedda v. Munachedda	
» mònacu Monachella go- la nera	89	Munaceddùzza Capinera-Occhio- cotto	72 74
» niru o niuru Monachel- la nera	90	Munachèdda Cianciallegra-Bale- struccio	53 103
Mazzacani Piviere tortolino	201	» biunna Monachella	88
Mazzunieddu Balestruccio	103	» cuda longa Codibu- gnolo siculo	55
Mbucca muschi Lui piccolo	63		
» » iancu Lui bianco	65		



Palumma ruccalora Piccione sel-		Pássera di buoscu Totavilla	40
vatico	190	» di campagna Passera la-	
» servàggia Piccione sel-		gia, Passera mattugia	24 27
vatico	190	» di canali Passera sarda	26
Palummazza Colombaccio	192	» di muntagna Passera	
Papagnedda Gabbianello	237	mattugia	27
Papanzicu Cinciallegra	53	» di pantanu Passera di	
» picciriddu Cinciarella	54	palude	36
Pàpara Oca selvatica	163	» di vuòscu Passera lagia	24
Papardedda o Papardeddu Alzavola	167	» du distrettu » »	24
Paparedda Marzaiola	168	» muntagnisi Zigolo nero	31
Paparùni Oca granaiola	164	» muttu Passera lagia	24
Papazzinu Regolo	56	» sbirru » sarda	26
Papiòla Pantana	214	» solitáriu o sulitáriu Pas-	
» beccu-stortu Piovanello	205	sero solitario	86
» 'mpiriáli Pettegola	213	Patúru Tarabuso	160
» nira Totano moro	211	Páula Cornacchia grigia	2
Papiolédde o Papiulédde Piova-		Pavuncellu Pavoncella	202
nello pancia nera-Gam-		Pavunieddu »	203
becchio	206 207	Pedi-laóngni Cavaliere d'Italia	218
Pappaciciau Rigogolo	13	Pellicanu Pellicano	182
Pappaciúscu Figliamosche	60	Perciabúddi Porciglione	246
» mónacu Balia nera	61	» piccinlu Schiribilla	242
Pappaciusecuni Balia dal collare	62	» » cu li pedi giar-	
Pappaiaddiscu Crociere	21	ni Schiribilla	
Pappa-muschi Balia nera	61	grigiata	249
Pappiòla Piovanello pancia ne-		Pércia gáia Scricciolo	100
ra	206	Perciarrivetti o Perciaruvetti Scric-	
Parrinu Svasso Maggiore	186	ciolo	100
Pasqualinu Capovaccio	145	Percia-ruvetti Luí grosso	64
Pássara Passera sarda	26	Percia-sciara Porciglione	246
» americana Ciuffolotto	20	Percia varrili Picchio rosso mag-	
» di vuòscu Passera lagia	24	giore	114
Passarastra o Passarastru Passera		» » nicu Picchio rosso	
lagia	24	minore	116
Passareddu o Passarellu Passera		Pettu azzurru o Pettu brú Pet-	
sarda	26	t'azzurro a macchia bianca	96
Passarieddu Passera sarda	26	» giallu Verzellino	19
» di passa Passera la-		» russu Pettiroso	97
gia	24	Piamuntisi Corvo nero	3
Pássaru Passera sarda	26	Pica Gazza	6
» americanu Ciuffolotto	20	Picchiu Picchio muratore	52
» d'acqua Passera di palude	36	Picciuni tudisinu Colombella	191

Pigghia muschi Pigliamosche	60	Pispisé Basettino	56bis
Pigghiùgghiu Frullino	225	Pitarra Gallina prataiola	243
Pileri Piviere dorato	201	» grossa Ottarda	242
Pillicanu o Pilucani Pellicano	182	Pitirri o Pitirru Tuffetto	188
Pinnacchiera Bubbola-Sgarza ciuf-		Pittidda Pettiroso	97
fetto	110 157	» viridi Luí verde	66
Pinnazzóla Cinciallegra	53	Pittirru Pettiroso	97
» endu longa Cudibugno-		Pittuzzu russu Pettiroso	97
lo siculo	55	Piula Barbagianni	125
Pinsuni o Pinzuni Fringuello	23	Pizzafièrru Gruccione	109
Pintu miranla Rigogolo	13	Pizza rè Piombina	112
Piozuneddu Verzellino	19	Pizzica-ferru Picchio muratore	52
Piola Barbagianni	125	» » maggiúri Picchio ros-	
Pipituna o Pipituni Bubbola	110	so maggiore	114
Pirnicanu Coturnice	257	» » nienu Picchio rosso	
Pirnici »	257	minore	116
» di mari Pernice di mare	197	» » testa russa Picchio	
Pirnciaru Sparviere	139	rosso mezzano	115
Pirnizzola Cinciallegra	53	» » viridi Picchio verde	113
» picciula Cinciarella	54	» -muru Picchio muraiolo	51
Pirrá-pirrá Ciuffolotto	20	Pizziddu tuórtu Rampichino co-	
Piruechiéra Sgazza ciuffetto-Nit-		mune	50
tícora	157 158	Pizzilia zucchi Picchio muratore	52
Piruechiúsa	209	» » picciriddu Rampi-	
Píspicia di canali Ballerina gialla	47	chino comune	50
» di frischia » »	47	» » russu Picchio rosso	
» gialla » »	47	maggiore	114
» ianca » bianca	48	Pizzu a cucchiaruni Spatola	150
» svária » nera	49	Pizzu longu Piglia-mosche	60
Píspisa carbonara Cutrettola ca-		» moddu » »	60
pinera	45	Pizzula-zucchi o Pizzulia-zucchi	
» cu lu pettu giálinu Cutret-		Picchio muratore	52
tola del Ray	46	Pizzutórtu Crociere	21
» cu lu pettu jancu Cutret-		Pola Taccola	4
tola capinera	45	Primavera Cinciallegra	53
» di ciúmi Cutrettola capinera	45	Proscúnenlu Stiaccino	91
» di primavera Cutrettola		Puddicinu Porciglione	246
del Ray	46	» di mari Corriere grosso	
» giárna Cutrettola del Ray		Piro-piro culbian-	
e Ballerina gialla	46 47	co	198 215
» ianca Ballerina bianca	48	Pulicicchiu Scricciolo	100
» virritána Cutrettola del		Panzuni Fringuello	23
Ray	46	Purpurédde Alzavola	167

Purpurédda tabacchina Moretta ta- baccata	175	Riiddi tapputu Regolo	56
		Rinnina di campagna Rondine	102
<b>Q</b>		» di Barbaria Rondine ros- siccìa	102bis
Quaetru Berta maggiore	185bis	» di casa Rondine	102
Quàgghia Quaglia	258	» d'inviernu » montana	105
Quagghiarina Calandrino	38	» di malu tiempu Rondine montana	105
Quàglia Quaglia	228	» di mari Rondine di mare	230
» di mari Piro-piro piccolo	217	» » muati Rondine mon- tana	105
» tringni Quaglia tridattila	256	» rocca Rondine moutana	105
<b>R</b>		» griscia Topino	104
Raiddu Sericciolo	100	» marzudda Rondine	102
Rappareddu Verzellino	19	» munaachedda Topino	104
Rapparidduni »	19	» mutaredda »	104
Rapparieddu »	19	» nivalora Rondine mon- tana	105
Re di quágghi veru Re di quaglie	250	Rinnina suricina Topino	104
» di li beccafieu Cannareccione	68	Rinninèdda di campagna Rondine	102
» di li gaddazzi Tarabuso	160	» d'inviernu	105
» di li gambette Combattente	209	» di ripa	104
» di li linguinedde Píspolone	43	Rinninùni di livanti Rondone al- pino, Rondo- ne nero	106 107
» di li marvizzi Tordela gaz- zina	79	» di maìsi Rondone nero	107
» di li quágghi Re di quaglie	250	» di mari	183
» di li quàgli » »	250	» di passa Rondone al- pino	106
Re di li riiddi Regolo	56	» di rocca Rondone al- pino	106
» » » turdi Tordela gazzina	79	» imperiali Rondone al- pino	106
Retiquágghiu Gruccione	109	» niuru Rondone nero	107
Rieignuòlu Usignuolo	95	» piettu biancu Rondone alpino	106
» di fiumi Rusignolo di fiume	67	» scravágghiu Rondone nero	107
Riddena Marzaiola	168	Risignuòlu Usignuolo	95
Riddeni Canapiglia	169	Ritedda Canapiglia	169
Riggina di quágghi o di quàgli Re di quaglie	250	Rivirsinnu Occhione	195
Riguddiu Sericciolo	100	Rossellu Airone rosso	153
Riiddu »	100	Runnùni Rondone nero	107
» di pantann Beccamoschino	78		
» di rocca Foramacchie	100		
» di rovu »	100		
» grossu Luí grosso	64		

Rusci Barbagianni	125	Scacciamargi picciulu Frullino	225
Rùscia Gufo comune	122	Scacciamennuli o Scaccia-miennuli	
Rusignòlu Usignuolo	95	Frosone	14
» di lagu Rusignolo di fiume	67	Scavazzuni Quattrocchi	177
» di màrgiù Cannareccione	68	Scavuni Moriglione	174
Rusignulùni Cannareccione	68	Scavuzza Quattrocchi	177
» di cannitu Rusignolo di fiume	67	Scavuzzu Moretta, Folaga cresta-ta	176 255
Russeddu carisi Airone Rosso	153	» occhi bianchi Moretta tabaccata	175
» cinnirusu Nitticora	158	Sciabachòddu Tarabusino	159
» di cannitu Tarabusino	159	Sciabocchi Sgarza ciuffetto	157
» giòrnu Sgarza ciuffetto	157	Seignu selvaticu Ciguo selvatico	162
» iancu Garzetta	154	Scipiòlu Assiolo	121
» » 'mpiriali Airone bianco	155	Scornagliaiu Ghiandaia marina	111
Russedda picciulu Tarabusino	159	Seravagghiuni Rondone nero	107
» rara Airone guarda buoi	156	Sericciulu Sericciolo	100
» rassu Airone rosso	153	Scupiu Assiolo	121
Russiddazzu » »	153	Scurriola Cappellaccia	39
Russiddotta o Russiddotta Sgarza ciuffetto	157	Serra Smergo minore	179
Russidduni cinirusu Airone cen- rino	152	Serracchiavi Picchio rosso mag- giore	114
Russièddu v. Russeddu		Sgargia margiu Piro-piro bosche- recchio	216
Russulidda o Russuliddu occhi bian- chi Moretta tabaccata	175	Sgrieciulu Sericciolo	100
Rutedda Canapiglia	169	Sgròu Gru	244
		Sinacciulàru Verzellino	19
		Sirrètta Smergo minore	179
		Smerru Merlo	84
		Smidigghiu Smeriglio	128bis
		Smuzzalòru riali Svasso piccolo	187
		» pampineri Tuffetto	188
Saccu Pellicano	182	Spagnulettu Calandro	42
Sagna-cavaddu Cinciarella	54	Sparvéri Sparviere	139
Saittuni Ballerina gialla	47	Spàtala	150
Sammartinu Piombina	112	Spércia gaia Sericciolo	100
Sanguisugàru Mignattaio	151	» macchi Sericciolo	64.100
Sardara Uccello delle tempeste	183	» mura Sericciolo	100
Santa-'mpizzu Saltimpalo	92	» pagghiara Sericciolo	100
Sbrivireddu Corriere grosso	198	» vanèddi »	100
» testa grossa Corriere piccolo	199	Spiriticchiu	207 208
Scacciamargi o Scacciamargiu Bec- caccino reale	223	Sprivèri	139
		» di maisi	201

**S**

Spirviéri	139	Tirúni Colombaccio	192
Sprivirèddu	210	Tistaredda Gheppio	131
Spuntascébi	74	» di passa Smeriglio	128bis
» niura	72	» farastera Falco gril-	
» russu	76	» laio	130
Spunzúni Fringuello	23	» tunisina Falco cucúlo	129
» imperiali Frosone	14	Tistazza cinnirina Averla cenerina	58
Sputa-marruggia Saltimpalo	92	» griscia » »	58
Squaióttu Sgarza ciuffetto	157	» nica » piccola	59
Stagnotta Albastrello — Piro-pi-		Tistuni Frosone — Gobbo rug-	
ro culbiano	212 215	» ginoso	14 178
Stilettu Piviere dorato	201	Titibúbbu Bubbola	110
Stracca-caccia Cavaliere d'Italia	218	Titibússu »	110
Striula Barbagianni	125	Torriagri Berta maggiore	185bis
Struneddu Storno nero	11	Tremacúda o Trimacúra Balleri-	
» paisanu cu pizzu giarnu		» na bianca	48
» Storno nero	11	Triorva Gufo di palude	123
» russu Storno roseo	12	Triúgni Quaglia tridattila	256
Sturneddu o Sturnieddu Storno	10	» martidduzzu Calidra	210
» paisanu Storno nero	11	Triúgnia Quaglia tridattila	256
» di passa Storno	10	Trizzetta Marzaiola	168
Sturnu » » »	10	Trizzola Alzavola	167
» niuru Storno nero	11	» marzudda Marzaiola	168
Sulitariu di rocca Passero solitario	86	» pollina »	168
Sureitèddu Schiribilla	248	Trizzotta Alzavola	167
» cu li pedi giarni Schiri-		Trizzutédda Alzavola	167
billa grigiata	249	Trorza Saltimpalo	92
		Trummittédda Tarabusino	159
		Tuduni Colombaccio	192
		Tummalòru Tuffetto	188
		» di li grossi Strolaga	
		» minore	189
		Tummaredda Svasso piccolo	187
		Tummarèddu Tuffetto	188
		Tupputu Moretta	176
		Turdu Tordo	80
		» carbonàru Merlo col petto	
		» bianco	83
		» di passa Merlo col petto	
		» bianco	83
		» polinu Tordela gazzina	79
		Turdu russu Tordo sassello	82
		» » carisu Tordela gaz-	

T

zina	79	Vutùru Grifone	146
Tardu vera Tordo	80	» barbatu Avvoltoio degli	
» zita Tordo sassello	82	agnelli	144
Turdulici Tordela	81	» biancu Capovaccaio	145
Turduni Codirossone	85	» niuru Avvoltoio	147
Turduruni Tordela gazzina	79	» cu pettu russastru Avvol-	
Turriazzèdda Chiurlottello	221	toio degli agnelli	144
Turriazzòlu di iaddazzi Chiurlot-		Vuzzacchiu Pojana	134
tello	221	<b>Z</b>	
Turriazzu Chiurlo maggiore	220	Zingaròtta Moretta	176
Turtira Tortora	193	Zinzicula Zigolo muciatto	33
Turtula »	193	» giarna Zigolo nero	31
Turtura »	193	Zinzola » muciatto	33
Turturàru Cuculo	118	Ziriola marzudda Marzaiola	168
» tuppàta Cuculo col		Zinlu Zigolo nero	31
ciuffo	119	» cinnirinu Zigolo muciatto	33
Turuni Colombaccio	192	» di pantanu Migliarino di	
Tuvittùla Totavilla	40	palude	34
<b>U</b>		» giallinu Zigolo giallo	30
Uechialuni tunisinu Fratino	200	» svariu » capinero	29
Urgananti Fenicottero	161	» testa nira Zigolo capinero	29
Uvaredda di margi Pivieressa	202	Zivédde Pispola	44
» di mari »	202	Ziveddu di pantanu Spioncello	44bis
» griscia »	202	Zividuni Pispolone	43
<b>V</b>		Zivinèddu Lui piccolo	63
Vaddarànu Mignattaio	151	Zivittula Civetta	124
Vaètra Berta maggiore	185bis	Zivulu Zigolo nero, Zigolo mu-	
Varvaianni Barbagianni	125	ciatto	31 33
Varvariseu Canapiglia	169	» cinnirinu Zigolo muciatto	33
Vèchia Ottarda	242	» di pantanu Fanello, Mi-	
Vecchiazzu Barbagianni	125	gliarino di palude	18 34
Vignignuólu Gruccione	109	» giallu Zigolo giallo	30
Vincinzèdda Cinciallegra	53	» monacu » capinero	29
Virdèddu Lui verde	66	» vavariseu Zigolo giallo	30
» iancu Lui bianco	65	Zizi Zigolo nero	31
Virdiddàni Lui verde	66	Zizinon Strillozzo	28
Virdièddu Lui verde	66	Ziziu Zigolo nero	31
Virdaliddu Lui verde	66	Zuinu Zigolo nero	31
» di li grossi Lui verde	66	» di rocca Fanello	18
Virduni Verdone	15	» giarnu Zigolo giallo	30
Vuturazzu Grifone	146	» marzeddu Fanello	18
		Zuvinu Fanello	18



Classe AVES  
Ord. PASSERES  
Fam. CORVIDAE

*Caratteri.* Forme pesanti e massicce. Becco conico più o meno lungo, (quanto la testa nei Corvi, più corto nelle Gazze) con bordi taglienti; narici ricoperte di lunghe setole. Tarsi e dita robusti e squamosi. Coda breve nei Corvi e lunga nelle Gazze.

Gen. *Corvus* L.

- 1 \*\*\* *Corvus corax corax* L. *Corvo imperiale* S. Ca. Tutta la Sicilia (fig. 2).
- 2 \*\*\* *Corvus cornix* L. *Cornacchia grigia* S. C. Tutta la Sicilia meno Palermo.
- 3 \*\*\* *Corvus frugilegus frugilegus* L. (*Trypanocorax frugilegus* L.) *Corvo nero* I. X-IV, C. Messina (fig. 5).

Gen. *Coloeus* Kaup.

- 4 (\*\*) *Coloeus monedula spermologus* Vieillot (*Corvus monedula spermologus* Vieillot, *Lycos monedula* L.) *Taccola* S. C. Tutta la Sicilia (fig. 4).

Gen. *Nucifraga* Brisson

- 5 *Nucifraga caryocatactes* L. *Nocciolaia* S. R. M. Catania (fig. 1).

Gen. *Pica* Vieillot

- 6 \*\*\* *Pica melanotos* Brehm (*Pica caudata*, *Pica rustica* Scop., *Pica pica* L.) *Cecca*, *Gazza* S. P. C. Tutta la Sicilia (fig. 3).

Gen. *Garrulus* Vieillot

- 7 \*\*\* *Garrulus glandarius fasciatus* Brehm (*Garrulus Kleinschmidti*, *Garrulus glandarius* L.) *Ghiandaia* S. C. Tutta la Sicilia.

Gen. *Pyrrhocorax* Vieillot

- 8 (\*\*) *Pyrrhocorax pyrrhocorax* L. (*Pyrrhocorax graculus* L., *Graculus graculus* L., *Coracia gracula* L., *Fregillus graculus* L.) *Gracchio corallino* S. R. M. Madonie (fig. 22).  
9 *Pyrrhocorax alpinus* Vieillot *Gracchio* A.

Fam. STURNIDAE

*Caratteri.* Uccelli di taglia media con il corpo raccolto, ali lunghe, coda breve e tarsi robusti. Becco di forma caratteristica: lungo, dritto, conico, qualche volta alquanto compresso e ricurvo all'estremità. Più maggio duro.

Gen. *Sturnus* L.

- 10 (\*\*) *Sturnus vulgaris vulgaris* L. *Storno* I. IX-III, C. Tutta la Sicilia.  
11 (\*\*) *Sturnus unicolor* Temm. *Storno nero* S. C. Tutta la Sicilia.

Gen. *Pastor* Temminck

- 12 *Pastor roseus* L. *Storno roseo* A. (fig. 23 e 24).

Fam. ORIOLIDAE

*Caratteri.* Becco della lunghezza della testa, robusto, conico-convesso, con l'estremità lievemente intagliata. Narici basali, ovali, incavate in una spessa membrana. Ali lunghe, sub-ottuse. Coda mediocre, ampia, leggermente arrotondata. Tarsi robusti e squamosi, più corti del dito medio. Unghie mediocri, quella del pollice più robusta ed uncinata.

Gen. *Oriolus* L.

- 13 *Oriolus oriolus oriolus* L. (*Oriolus galbula* L.) *Rigogolo* (fig. 25) C. E. P. IV IX Tutta la Sicilia.

Fam. FRINGILLIDAE

*Caratteri.* Becco caratteristico, dritto o quasi dritto, con la base meno larga della testa; mandibola superiore oltrepassante notevolmente quella inferiore.

Gen. *Coccothraustes* Pallas

- 14 *Coccothraustes coccothraustes coccothraustes* L. (*Coccothraustes vulgaris* Pallas) *Frosone* (fig. 8) S. P. IX-XI Tutta la Sicilia.

Gen. **Chloris** Cuv.

- 15 *Chloris chloris aurantiiventris* Cabanis (*Ligurinus chloris* L.) *Verdone* C. S. Tutta Sicilia.

Gen. **Carduelis** Brisson

- 16 *Carduelis carduelis weigoldi* Reichenow (*Carduelis elegans* Stephens) *Cardellino* C. S. Tutta la Sicilia.  
17 *Carduelis spinus* L. (*Chrysomitris spinus* L., *Spinus spinus* L.) *Lucarino* (fig. 6) R. S. Pi. Tutta la Sicilia.  
18 *Carduelis cannabina mediterranea* Tschiusi (*Linota cannabina* L., *Cannabina linota* Gmel.) *Fanello* C. S. Tutta la Sicilia.

Gen. **Serinus** Koch.

- 19 *Serinus canarius serinus* L. (*Serinus hortulanus* Koch, *Serinus serinus* L.) *Verzellino* (fig. 7) S. Tutta la Sicilia.

Gen. **Pyrrhula** Pallas

- 20 *Pyrrhula pyrrhula europaea* Vieillot *Ciuffolotto* A. Messina.

Gen. **Loxia** L.

- 21 *Loxia curvirostra curvirostra* L. *Crociere* (fig. 10) R. S. Messina, Catania, Madonie.

Gen. **Carpodacus** Kaup.

- 22 *Carpodacus erythrinus* Pallas. *Beccogrosso scarlatto* A. Palermo autunno.

Gen. **Fringilla** L.

- 23 (\*\*) *Fringilla coelebs coelebs* L. *Fringuello* C. S. Tutta la Sicilia.

Gen. **Petronia** Kaup.

- 24 *Petronia petronia petronia* L. (*Petronia stulta* Gmelin) *Passera lagia* S. M. I. Tutta la Sicilia.

Gen. **Passer** Koch.

- 25 \* *Passer italiae* Vieillot *Passera d'Italia*, *Passera* S. Messina. Enna.

- 26 \* *Passer hispaniolensis hispaniolensis* Temm. (*Passer salicicola* Vieillot) *Passera sarda* (fig. 11) S. C. Tutta la Sicilia.
- 27 \* *Passer montanus montanus* L. *Passera mattugia* S. M. Enna.

Fam. EMBERIZIDAE

*Caratteri.* Becco conico, compresso, appuntito, bordi delle due mandibole fortemente incurvati. Ali ampie, sub-acute. Coda lunga. Tarsi della lunghezza del dito medio. Dita brevi, con unghie aguzze leggermente arquate; quella del pollice della lunghezza del dito o più corta. Piumaggio più o meno colorato.

Gen. *Emberiza* L.

- 28 *Emberiza calandra calandra* L. (*Miliaria projer* Müll.) *Strillozzo* (fig. 12) S. Tutta la Sicilia.
- 29 *Emberiza melanocephala* Scopoli *Zigolo capinero* A. Catania, Messina.
- 30 *Emberiza citrinella citrinella* L. *Zigolo giallo* R. S. Ter-  
ranova, Caltanissetta, Catania, Enna.
- 31 *Emberiza cirrus* L. *Zigolo nero* S. Tutta la Sicilia.
- 32 *Emberiza hortulana* L. *Ortolano* Pi. Tutta la Sicilia.
- 33 *Emberiza cia cia* L. *Zigolo muciatto* S. M. Messina, Ca-  
tania, Palermo.
- 34 *Emberiza schoeniclus schoeniclus* L. (*Cynchramus schoe-  
niclus* L.) *Migliarino di palude* S. L. Tutta la Sicilia.
- 35 *Emberiza caesia* Chretschmar *Ortolano grigio* A. Messina.
- 36 *Emberiza palustris* Savi (*Emberiza pyrrhuloides* Pallas)  
*Passera di palude* C. S. Tutta la Sicilia.

Fam. ALAUDIDAE

*Caratteri.* Becco più corto della testa, conico, guarnito alla base di piccole piume rigide, dirette in avanti e nascondenti in parte le narici. Ali oblunghe. Coda mediocre, intagliata. Tarsi un poco più lunghi del dito medio. Unghia del pollice della lunghezza di quel dito o poco più lunga e quasi dritta.

Gen. *Melanocorypha* Boie

- 37 *Melanocorypha calandra calandra* L. *Calandra* S. Catania, Siracusa, Caltanissetta, Enna, Palermo.

Gen. *Calandrella* Kaup.

38. *Calandrella brachydactyla brachydactyla* Leisler *Calandrino*, *Calandrella* P. E. Tutta la Sicilia.

Gen. *Galerita* Boie

39. *Galerita cristata pallida* Brehm. (*Alauda cristata* L.) *Capellaccia*, *Allodola capelluta*, *A. dal ciuffo* (fig. 14) C. S. Tutta la Sicilia.

Gen. *Lullula* Kaup.

40. *Lullula arborea arborea* L. (*Alauda arborea* L.) *Totavilla* S. M. Catania, Euna.

Gen. *Alauda* L.

- 41 \* *Alauda arvensis arvensis* L. *Lodola*, *Allodola*, *Panterana* C. S. P. Tutta la Sicilia.

Fam. MOTACILLIDAE

*Caratteri.* Le specie del Gen. *Anthus* somigliano alle allodole. Becco mediocre, sottile, dritto, intagliato all'estremità della mandibola superiore. Ali allungate, sub-acute. Coda mediocre, ampia intagliata. Tarsi e dita sottili; pollice compresa l'unghia lungo quanto il dito medio o più lungo. Unghia del pollice più lunga del dito e leggermente ricurva.

Il Gen. *Motacilla* è invece caratterizzato da un becco sottile, dritto e angoloso fra le narici. Ali lunghe, sub-acute. Coda più lunga del corpo. Tarsi lunghi e sottili. Unghia del pollice della lunghezza del dito e ricurva.

Gen. *Anthus* Bechstein

42. *Anthus campestris* L. (*Agrodroma campestris* L.) *Calandro* E. P. V.  
43 (\*\*). *Anthus trivialis trivialis* L. *Pispolone*, *Prispolone* (fig. 15) I. P. V e IX Messina.  
44 (\*\*). *Anthus pratensis* L. *Pispola* P. e S. C. Tutta la Sicilia.  
44 bis (\*\*). *Anthus spinoletta spinoletta* L. *Spioncello* P. Autunno Messina, Siracusa, Lentini.

Gen. **Motacilla** L.

- 45 Motacilla flava feldeggi Michahelles (Budytes feldeggi Mich., Budytes melanocephalus Licht.) *Cutrettola capinera* P. IV-VI S. Enna.
- 46 Motacilla flava rayi Bonaparte *Cutrettola del Ray*, *Cutrettola gialla* P. IV-IX.
- 47 Motacilla cinerea cinerea Tunstall. (Motacilla sulphurea Salvadori) *Ballerina gialla* (fig. 16) P. IX, III.
- 48 Motacilla alba alba L. *Ballerina bianca* (fig. 17) S. P. Tutta la Sicilia.
- 49 Motacilla alba Yarrellii Gould (Motacilla alba lugubris Temminck, Motacilla lugubris Temminck) *Ballerina nera* R. Messina.

Fam. CERTIIDAE

*Caratteri.* Uccelli di piccola taglia, col corpo slanciato. Becco lungo e sottile, leggermente arquato. Narici basali, ovalari a metà chiuse da una membrana. Ali sub-ottuse. Coda allungata a penne rade, consumata all'estremità. Tarsi brevi, dita lunghe, squamose; il dito posteriore più robusto e munito di una unghia robusta, molto uncinata.

Gen. **Certhia** L.

- 50 \*\* Certhia brachydactyla ultramontana Hartert (Certhia familiaris L.) *Rampichino comune* (fig. 27) S. C. Tutta la Sicilia.

Gen. **Tichodroma** Illiger

- 51 \*\* Tichodroma muraria L. *Picchio muraiolo* (fig. 33) S. Messina, Catania.

Fam. SITTIDAE

*Caratteri.* Becco intero conico verso l'estremità. Narici basali, lineari, in parte nascoste dalle piume frontali. Ali mediocri. Coda breve e quadrata, composta di piume molli e flessibili. Tarsi brevi, squamosi, dita sottili. Unghia del pollice robustissima e uncinata. Lingua cartilaginosa, breve e bifida, leggermente protrattile.

Gen. **Sitta** L.

- 52 \*\* Sitta europea caesia Meyer (Sitta europea Wolf, Sitta caesia Wolf.) *Picchio muratore*, *Picchiotto* (fig. 26) S. R. Palermo, Catania, Messina.

Fam. PARIDAE

*Caratteri.* Piccoli uccelli cantori. Becco breve, intero, conico convesso. Narici ricoperte di setole o di pinne dirette in avanti. Tarsi e dita robusti. Unghe, soprattutto quella del pollice, forti e ricurve.

Gen. *Parus* L.

- 53 \*\* *Parus major major* L. *Cinciallegra* (fig. 18) S. C. Tutta la Sicilia.  
54 \*\* *Parus coerules* L. *Cinciarella* S.

Gen. *Aegithalus* Hermann.

- 55 \*\* *Aegithalus caudatus siculus* Withaker (*Acredula sicula* With., *Orites caudatus siculus* With.) *Codibugnolo siciliano* (fig. 13) S. M.

Gen. *Regulus* Vieillot

- 56 \*\* *Regulus regulus regulus* L. (*Regulus cristatus* Koch.) *Regolo, Regolo col ciuffo*. S. C. Tutta la Sicilia.  
56 a \*\* *Regulus ignicapillus ignicapillus* Temm. *Fiorrancino* (fig. 34) S. C. Tutta la Sicilia.

Gen. *Panurus* Koch.

- 56 bis *Panurus biarmicus biarmicus* L. *Basettino* S. L. Tutta la Sicilia.

Fam. LANIIDAE

*Caratteri.* Becco robusto, convesso, compresso, guarnito di peli alla base, con la mandibola superiore dentata e la inferiore più corta e rilevata all'estremità. Narici arrotondate, chiuse a metà da una membrana. Ali sub-ottuse. Coda di lunghezza variabile. Tarsi e dita squamosi. Unghe uncinatè, taglienti, le posteriori più robuste.

Gen. *Lanius* L.

- 57 *Lanius senator senator* L. (*Lanius rufus* Briss., *Lanius auriculatus* Müller) *Averla capirossa* (fig. 19) E. IV-X Tutta la Sicilia.  
58 *Lanius minor* Gmelin *Averla cenerina* E. IV-X. Tutta la Sicilia.

- 59      *Lanius collurio collurio* L. (*Enneoctonus collurio* L.) *Averla piccola* E. IV-X. Tutta la Sicilia.  
59 bis   *Lanius excubitor* L. *Averla maggiore* R. Palermo, Siracusa.

Fam. MUSCICAPIDAE

*Caratteri.* Becco breve, depresso, ad angolo vivo, a bordi dritti, punta sottile uncinata e intagliata. Setole brevi ornano la base delle due mandibole formando un reticolo che chiude i due lati della bocca. Ali relativamente lunghe. Coda mediocre e di forma variabile.

Gen. *Muscicapa* L.

- 60 (\*\*) *Muscicapa striata striata* Pallas (*Muscicapa grisola* L.) *Pigliamosche* E. IV-IX.  
61 (\*\*) *Muscicapa hypoleuca hypoleuca* Pallas (*Muscicapa atricapilla* L. *Balia nera* E. IV. Tutta la Sicilia.  
62 (\*\*) *Muscicapa albicollis* Temminck (*Muscicapa collaris* Bechstein) *Balia dal collare* E. IV-VIII C. Tutta la Sicilia.

Gen. *Phylloscopus* Boie

- 63 (\*\*) *Phylloscopus collibita collibita* Vieillot (*Phylloscopus rufus* Bechstein) *Luì piccolo* S. M. Tutta la Sicilia.  
64 \*\*   *Phylliscopus trochilus trochilus* L. *Luì grosso*, *Luì giallo*, P. III-IV, VIII-IX. Nidifica Messina e Catania.  
65 \*\*   *Phylloscopus bonelli bonelli* Vieillot *Luì bianco* P. IV VIII-IX. Tutta la Sicilia.  
66 \*\*   *Phylloscopus sibilatrix sibilatrix* Bechstein (*Phylloscopus sibilator* Salvadori) *Luì verde* (fig. 28) E. III-IX Piano. Tutta la Sicilia.

Gen. *Cettia* Bonaparte

- 67 \*\*   *Cettia cetti cetti* Temm. *Rusignolo di fiume* S. Paludi. Tutta la Sicilia.

Gen. *Acrocephalus* Nauman

- 68 (\*\*) *Acrocephalus arundinaceus arundinaceus* L. *Cannareccione*, *Cannaiola maggiore* E. Messina, Siracusa, Catania.  
69 (\*\*) *Acrocephalus scirpaceus scirpaceus* Herman (*Acrocephalus streperus* Vieillot) *Cannaiola* R. E. Messina.



Gen. *Sylvia* Scopoli

- 70 (\*\*) *Sylvia hortensis hortensis* Gmelin (*Sylvia orphea* Temm.,  
*Curruca orphea* Temm.) *Bigia grossa* R. Messina, Catania.
- 71 (\*\*) *Sylvia borin borin* Boddaert (*Sylvia hortensis* Bechstein)  
*Beccafico*, *Bigione* E. IV-X.
- 72 (\*\*) *Sylvia atricapilla atricapilla* L. (*Monacus atricapillus* L.)  
*Capinera* S. I. Tutta la Sicilia.
- 73 (\*\*) *Sylvia comunis comunis* Latham (*Sylvia cinerea* Bechst.,  
*Curruca cinerea* Bechst.) *Sterpazzola* E. IV-X. Catania.
- 74 (\*\*) *Sylvia melanocephala melanocephala* Gmelin (*Pyrophthal-*  
*ma melanocephala* Gmelin) *Occhiocotto*, *Occhio rosso* (fig. 9)  
S. M. Tutta la Sicilia.
- 75 (\*\*) *Sylvia cantillans cantillans* Pallas (*Sylvia subalpina* Bo-  
nelli) *Sterpazzolina* E. Catania, Messina, Palermo.
- 75 bis (\*\*) *Sylvia conspicillata conspicillata* Temm. *Sterpazzola di*  
*Sardegna* I. Tutta la Sicilia.
- 76 (\*\*) *Sylvia undata undata* Boddaert (*Melizophilus undatus*  
Bodd.) *Magnanina* S.
- 77 (\*\*) *Sylvia sarda* Temminck (*Melizophilus sardus* La Marm.)  
*Magnanina Sarda* S. Catania, Terranova, Caltanissetta,  
Enna.

Gen. *Cisticola* Kaup.

- 78 (\*\*) *Cisticola juncidis cisticola* Temm. (*Cisticola cursitans*  
Franklin) *Beccamoschino* S. Catania XII.

Fam. TURDIDAE

*Caratteri.* Uccelli cantori di grandi e medie dimensioni con corpo slanciato. Becco mediocre, quasi dritto, leggermente ricurvo all'estremità. Mandibola superiore più o meno intagliata. Tarsi mediocri, coperti davanti da una o più squame. Ali e coda di forma variabile.

Gen. *Turdus* L.

- 79 \* *Turdus pilaris* L. *Tordela gazzina*, *Cesena*, *Re dei Tordi*  
P. IX-X. Tutta la Sicilia.
- 80 \* *Turdus philomelus philomelus* Brehm. (*Turdus musicus* L.)  
*Tordo* (fig. 21 e 21 a) S. Tutta la Sicilia. Enna, Ottobre  
Marzo.

- 81 \* *Turdus viscivorus*, *viscivorus* L. *Tordela* R. S. Messina, Madonie, Catania, Enna.  
82 \* *Turdus iliacus* L. *Tordo sassello* R. P. X-III.  
83 *Turdus torquatus torquatus* L. (*Merula torquata* L.) *Merlo col petto bianco*, *Merlo dal collare* R. P. Autunno, Primavera. Palermo, Madonie, Messina.  
84 \* *Turdus merula merula* L. (*Merula nigra* Leach.) *Merlo* (fig. 30) C. S. Tutta la Sicilia.

Gen. *Monticola* Boie

- 85 (\*\*) *Monticola saxatilis* L. (*Petrociela saxatilis* L., *Turdus saxatilis* L.) *Codirosso* E. X Catania, Enna.  
86 \*\* *Monticola solitarius solitarius* L. *Passero solitario* S.M. Po.

Gen. *Oenanthe* Vieillot

- 87 *Oenanthe oenanthe oenanthe* L. (*Saxicola oenanthe* L.) *Culbianco* (fig. 20) P. IV e IX. Tutta la Sicilia.  
88 *Oenanthe hispanica hispanica* L. (*Saxicola stapazina* L.) *Monachella* P. IV IX.  
89 *Oenanthe hispanica melanoleuca* Gldenstadt (*Saxicola occidentalis* Salvadori, *Saxicola melanolenca* Gldenstadt) *Monachella a gola nera*, *Monachella dalle orecchie nere occidentale* P. IV IX Catania, Messina.  
90 *Oenanthe leucura leucura* Gmelin (*Saxicola leucura* Gmelin, *Dromolaea leucura* Gmelin) *Monachella nera*, *Cul bianco abbrunato* S. M. Messina, Catania, Palermo.

Gen. *Saxicola* Bechstein

- 91 (\*\*) *Saxicola rubetra rubetra* L. (*Pratincola rubetra* L.) *Stiaccino* (fig. 35) E.  
92 *Saxicola torquata hibernans* Hartert (*Saxicola rubicola* L., *Pratincola rubicola* L.) *Saltimpalo* S. Tutta la Sicilia.

Gen. *Phoenicurus* Forster.

- 93 (\*\*) *Phoenicurus phoenicurus* L. (*Ruticilla phoenicurus* L.) *Codirosso comune* E. M. R. Po.  
94 (\*\*) *Phoenicurus ochrurus gilbratariensis* Gmelin (*Ruticilla tithys* Scop., *Phoenicurus tithys* Scop.) *Codirosso spazzacamino* I. X-III M. Messina, Catania, Enna.

Gen. *Luscinia* Forster

- 95 (\*\*) *Luscinia megarhyncha megarhyncha* Brehm (*Luscinia vera* Sundeval, *Aedon lusciniæ* L., *Aedon megarhyncha* Breh., *Erithacus lusciniæ* L.) *Usignuolo, Rusignolo* E. III-X C. Tutta la Sicilia.
- 96 (\*\*) *Luscinia suecica cyanecula* Wolf. (*Erithacus cyanecula* Wolf.) *Pett'azzurro a macchia bianca* P. R. Primavera, Autunno, Catania.

Gen. *Erithacus* Cuvier

- 97 \*\* *Erithacus rubecula melophilus* Hartert *Pettirosso* S. C. Tutta la Sicilia.

Fam. ACCENTORIDAE (Prunellidae)

*Caratteri.* Si distinguono dai *Turdus* per la forma del becco i cui bordi sono ricurvi in avanti. Tarsi ricoperti di numerose grandi squame.

Gen. *Prunella* Vieillot

- 98 *Prunella collaris collaris* Scopoli (*Accentor collaris* Scopoli) *Sordone* S. M. Catania.
- 99 *Prunella modularis obscura* Tratz (*Accentor modularis* L., *Prunella modularis* L., *Tharrhaleus modularis* L.) *Passera scopaiola, Accentore canterino* S. C. M. Tutta la Sicilia.

Fam. TROGLODYTIDAE

*Caratteri.* Becco sottile, leggermente arquato, intero appuntito. Ali brevi, arrotondate, sub-ottuse. Coda breve, quadrata e arrotondata. Tarsi lunghi e sottili. Dito esterno unito alla base con il medio. Unghia del pollice più robusta ed arquata delle altre.

Gen. *Troglodytes* Vieillot

- 100 \*\* *Troglodytes troglodytes troglodytes* L. *Scricciolo, Re di macchia, Foramacchie, Forasiepe* (fig. 29) S. C. Tutta la Sicilia.

Gen. *Cinclus* Borkhausen

- 101 (\*\*) *Cinclus cinclus aquaticus* Bechstein, (*Cinclus aquaticus* Behst., *Cinclus cinclus merula* Shæffer) *Merlo acquaiuolo* S.

Fam. HIRUNDINIDAE

*Caratteri.* Becco breve, largo alla base, mandibola superiormente compressa e ricurva all'estremità. Ali lunghe e appuntite. Coda forcuta. Tarsi brevi e deboli. Quattro dita deboli di cui tre dirette in avanti.

Gen. *Hirundo* L.

- 102 \*\* *Hirundo rustica rustica* L. *Rondine* (fig. 31) C. Primavera Estate. Tutta la Sicilia.  
102 bis \*\* *Hirundo rufula* Temm. (*Hirundo capensis* Gml.) *Rondine rossiccia* R. Messina, Palermo.

Gen. *Delichon* Moore

- 103 \*\* *Delichon urbica urbica* L. (*Hirundo urbica* L., *Chelidon urbica* L.) *Balestruccio* (fig. 32) Primavera Estate III-X C. Tutta la Sicilia.

Gen. *Riparia* Forster

- 104 \*\* *Riparia riparia riparia* L. (*Cotyle riparia* L.) *Topino* C. II IX Tutta la Sicilia.  
105 \*\* *Riparia rupestris* Scopoli (*Biblis rupestris* Scop.) *Rondine montana* S. M. C. Tutta la Sicilia.

Ord. CYPSELI

Fam. CYPSELIDAE

*Caratteri.* Becco piccolo, breve, debole, molto largo alla base, compresso verso l'estremità che è leggermente uncinata. Ali lunghe strette e falcate. Coda composta di dieci retrici. Tarsi brevi, grossi, piumati. Le quattro dita dirette in avanti e armate di robuste unghie uncinatae.

Gen. *Apus* Scopoli

- 106 \*\* *Apus melba melba* L. (*Cypselus melba* L.) *Rondone alpino* (fig. 39 e 39 a) E. M. R. Po.  
107 \*\* *Apus apus apus* L. (*Cypselus apus* L.) *Rondone nero* E. III-VII C. Tutta la Sicilia.

Ord. CAPRIMULGI

Fam. CAPRIMULGIDAE

*Caratteri.* Corpo allungato, collo brevissimo, testa grande e larga. Becco breve e sottile tagliato oltre gli occhi, compresso alla base e con l'estremità leggermente uccinata. Ali lunghe, sub-acute. Coda leggermente arrotondata. Unghia del dito medio lunghissima, larga e dentata a pettine, le altre dita debolissime, specialmente il pollice che è brevissimo. Tarsi in parte piumati.

Gen. *Caprimulgus* L.

- 108 (\*\*) *Caprimulgus europaeus europaeus* L. *Succiacapre* (fig. 40)  
E. Tutta la Sicilia.

Ord. MEROPES

Fam. MEROPIDAE

*Caratteri.* Corpo slanciato. Becco allungato, leggermente curvo e grosso alla base. Tarsi brevi e sottili. Ali lunghe ed appuntite. Coda lunga con le retrici mediane notevolmente più lunghe delle altre.

Gen. *Merops* L.

- 109 *Merops apiaster* L. *Gruccione, Grottaione, Merope, Apiastro* (fig. 36) E. Rupi presso corsi d'acqua. Tutta la Sicilia.

Ord. UPUPAE

Fam. UPUPIDAE

*Caratteri.* Corpo svelto, slanciato, becco molto lungo, leggermente ricurvo, appuntito. Zampe corte e robuste. Ali lunghe, arrotondate, sub-ottuse. Coda quasi quadrata. Piumaggio morbido e debole.

Gen. *Upupa*

- 110 (\*\*) *Upupa epops epops* L. *Bubbola, Upupa* (fig. 37) E. IV-IX.  
Tutta la Sicilia.

**Ord. CORIACIAE**

**Fam. CORACIIDAE**

*Caratteri.* Becco della lunghezza della testa, dritto, robusto, largo alla base con l'estremità uncinata. Tarsi robusti, più corti del dito medio. Ali lunghe sub-acute. Coda composta di dodici penne, quasi tutte di uguale lunghezza.

**Gen. Coracias L.**

- 111 *Coracias garrulus garrulus* L. (*Coracias garrula* L.)  
*Ghiandaia marina* S. E. C. Tutta la Sicilia.

**Ord. ALCYONES**

**Fam. ALCEDINIDAE**

*Caratteri.* Testa grossa, corpo grosso e raccolto; piume di colori vivaci. Becco lunghissimo, robusto, dritto, appuntito. Tarsi brevi. Ali mediocri. Coda corta.

**Gen. Alcedo L.**

- 112 *Alcedo atthis ispida* L. (*Alceda ispida* L.) *Piombina*,  
*Martin pescatore* (figg. 38 e 38 a) S. L. Tutta la Sicilia.

**Ord. PICI**

**Fam. PICIDAE**

*Caratteri.* Corpo allungato. Becco robusto, dritto, conico, sprovvisto di cera, con l'angolo dorsale acuto e l'estremità tagliente. Lingua lunga e cornea, provvista sui bordi di cinque o sei uncini rivolti all'indietro. Tarsi brevi, dita in numero di quattro: due anteriori e due posteriori con unghie ricurve a semicerchio, forti e appuntite. Ali di lunghezza media, alquanto arrotondate. Coda inclinata in basso a tetto.

**Gen. Picus L.**

- 113 \*\* *Picus viridis sharpei* Saunders (*Picus viridis* L., *Gecinus viridis* L., *Gecinus Sharpei* Saunders) *Picchio verde* (fig. 41) S. M. Tutta la Sicilia.

Gen. *Dryobates* Boie

- 114 \*\* *Dryobates major hispanus* Schlüter (*Picus major* L., *Dendrocopus major* L.) *Picchio rosso maggiore* S. M. Tutta la Sicilia.
- 115 \*\* *Dryobates medius medius* L. (*Picus medius* L., *Dendrocopus medius* L.) *Picchio rosso mezzano* R. S. M.
- 116 \*\* *Dryobates minor minor* L. (*Dendrocopus minor* L. *Picus minor* L.) *Picchio rosso minore*, *Picchio minore* (fig. 45) S. Tutta la Sicilia.

Gen. *Jynx* L.

- 117 (\*\*) *Jynx torquilla torquilla* L. (*Yunx torquilla* L.) *Torcicollo* (figg. 42 e 42 a) E. S. Tutta la Sicilia.

Ord. CUCULI

Fam. CUCULIDAE

*Caratteri.* Forme slanciate, becco lungo, arquato, largamente spaccato. Ali lunghe, coda lunga, conica appiattita. Tarsi di lunghezza media con quattro dita: due anteriori e due posteriori.

Gen. *Cuculus* L.

- 118 (\*\*) *Cuculus canorus canorus* L. *Cuculo* (fig. 43) S. E. IV-IX. Tutta la Sicilia.

Gen. *Clamator* Kaup.

- 119 *Clamator glandarius* L. (*Oxylophus glandarius* L., *Coccytes glandarius* L.) *Cuculo col ciuffo* (fig. 44) A. Catania, Messina.

Ord. STRIGES

Fam. STRIGIDAE

*Caratteri.* Grandi occhi a fior di testa, circondati da un cerchio di piume a raggiera. Becco breve e ricurvo alla base. Cera ricoperta di piume setiformi. Piumaggio morbido; piume delle ali frangiate che rendono silenzioso il volo. Piedi frequentemente piumati fino all'estremità

delle dita. Dita armate di robusti artigli adunchi. Dito esterno mobilissimo.

Gen. **Bubo** Dumeril.

- 120 (\*\*) *Bubo bubo hispanus* Rothsch e Hart (*Bubo maximum* Gerini, *Bubo ignavus* Forst, *Bubo bubo* L.) *Gufo reale* S. R. Trapani.

Gen. **Otus** Pennant.

- 121 \*\* *Otus scops scops* L. (*Scops giu* Scopoli, *Scops scops* L.) *Assiolo* (fig. 48) E.

Gen. **Asio** Schaefferer

- 122 \*\* *Asio otus otus* L. *Gufo comune* (fig. 46) S. M. Tutta la Sicilia.  
123 \*\* *Asio flammeus flammeus* Pontoppidan (*Asio accipitrinus* Pallas) *Gufo di palude*, *Allocco di palude* S. P. Tutta la Sicilia.

Gen. **Athene** Boie

- 124 \*\* *Athene noctua vidalii* Brehm (*Athene noctua* Kaup, *Carine noctua* Scop.) *Civetta* (1) (fig. 49) S. C. Tutta la Sicilia.

Gen. **Strix** L.

- 124 bis \*\* *Strix aluco aluco* L. (*Syrnium aluco* L.) *Allocco* (fig. 47) S. Notturmo. Tutta la Sicilia.

Gen. **Tyto** Billberg

- 125 (\*\*) *Tyto alba alba* Scop. (*Flammea alba alba* Scopoli, *Strix flammea* L.) *Barbaggianni* (1) (fig. 95) S.C. Tutta la Sicilia.

---

(1) È consentita la cattura di questa specie per servire da zimbello.



## Ord. ACCIPITRES

### Fam. FALCONIDAE

*Caratteri.* Becco breve e possente, ricurvo fin dalla base, con la mandibola superiore armata di un dente e terminante in una punta estremamente uncinata. Tarsi di lunghezza media con dita allungate, armate di potenti artigli. Ali lunghe e appuntite.

#### Gen. Falco L.

- 126 \*\*\* Falco peragrinus peregrinus Tunstall (Falco comunis Gml.) *Falco pellegrino*, *Falco comune*, *Falcone* (fig. 50 e 50 a) S. C. Catania, Messina.
- 127 \*\*\* Falco biarmicus Feldeggi Schlegel (Falco Feldeggi Schlegel) *Lanario* R. S. M.
- 128 \*\*\* Falco subbuteo subbuteo subbuteo L. *Lodolaia* (fig. 51) R. S.
- 128 bis \*\*\* Falco columbarius aesalon Tunstall (Falco lithofalco L., Falco aesalon Tunstall.) *Smeriglio*, *Falco smeriglio* Sverna e passa X-III. Tutta la Sicilia.
- 129 (\*\*) Falco vespertinus vespertinus L. (Cerchneis vespertinus L.) *Falco cuculo*, *Barletta* P. C. Primavera Autunno. Tutta la Sicilia.
- 130 (\*\*) Falco neumanni neumanni Fleischer (Cerchneis neumanni Fleisch., Cerchneis tinnunculoides Temm. *Falco grillaio*, *Grillaio*, *Gheppio minore* R. E. Palermo, Catania, Messina.
- 131 (\*\*) Falco tinnunculus tinnunculus L. (Cerchneis tinnunculus L.) *Gheppio* (fig. 56) S. C. Tutta la Sicilia.

### Fam. AQUILIDAE

*Caratteri.* Becco dritto alla base, molto ricurvo nel terzo anteriore e senza tacca; narici grandi trasversali la cui cera è munita soltanto di qualche pelo (1); connesure del becco non oltrepassanti l'angolo anteriore dell'occhio. Piedi piumati fino all'origine delle dita che sono quasi tutte uguali fra loro e munite di unghie acute e taglienti, quella del dito medio munita di una scapalatura nel disotto e sul bordo esterno. Ali

---

(1) Negli avvoltoi (Gyps, Gypaetus, ecc.) la cera è ricoperta di lunghi peli che la nascondono interamente.

lunghe ottuse che raggiungono l'estremità della coda; questa è lunga, appiattita e cuneiforme.

Gen. **Aquila** Brisson

131 bis *Aquila chrysaëtus* L. *Aquila reale* A.

Gen. **Hieraaëtus** Kaup.

132 \*\*\* *Hieraaëtus fasciatus fasciatus* Vieillot (*Nisaëtus fasciatus* Vieillot) *Aquila del Bonelli* (fig. 53) S. M. Catania, Messina.

133 \*\*\* *Hieraaëtus pennatus* Gmelin *Aquila minore* A.

Gen. **Buteo** Lacépède

134 (\*\*) *Buteo buteo buteo* L. (*Buteo vulgaris* Leach) *Pojana* (fig. 52) S. Catania, Messina (Gennaio), Castelvetro, Primavera Enna.

Gen. **Circus** Lacépède

135 \*\*\* *Circus aeruginosus aeruginosus* L. *Falco di palude*, *Falco rossiccio* S. Messina, Catania, Enna.

136 \*\*\* *Circus Swainsoni* Smith (*Circus macrourus* Gmelin) *Albanella pallida*, *Albanella chiara* S. R. Messina.

137 \*\*\* *Circus cyaneus cyaneus* L. *Albanella reale* S. L. R. Tutta la Sicilia.

138 \*\*\* *Circus pygargus* L. (*Circus cineraceus* Montagn.) *Albanella minore* S. R. Messina, Trapani.

Gen. **Accipiter** Brisson

139 \*\*\* *Accipiter nisus nisus* L. *Sparviere* S. Pa. Tutta la Sicilia.

Gen. **Milvus** Lacépède

140 \*\*\* *Milvus milvus milvus* L. (*Milvus regalis* Bris., *Milvus icticus* Savigny) *Nibbio reale* R. S. Messina, Catania, più comune a Palermo.

141 \*\*\* *Milvus migrans migrans* Boddaert. *Nibbio nero* R. S. M. Tutta la Sicilia.

Gen. **Pernis** Cuvier

142 \*\*\* *Pernis apivorus apivorus* L. *Falco pecchiaiolo* P. IV IX Po. Catania, Messina, Trapani.

Gen. *Circaetus* Vieillot

- 143 \*\*\* *Circaetus gallicus* Gmelin *Biancone* R. R. M. Tutta la Sicilia.

Gen. *Gypaetus* Storr.

- 144 \*\*\* *Gypaetus barbatus grandis* Storr. *Avvoltoio degli agnelli, Arpia* (fig. 55) R. S. Madonie, Caronie, Monti di Alcamo.

Gen. *Neophron* Savigny

- 145 \*\*\* *Neophron percnopterus percnopterus* L. *Capovaccaio* S.M.

Gen. *Gyps* Savigny

- 146 \*\*\* *Gyps fulvus fulvus* Hablizl (*Gyps fulvus* Gmelin) *Grifone, Avvoltoio* (fig. 54) S. M. C. Tutta la Sicilia.

Gen. *Aegyptius* Savigny

- 147 \*\* *Aegyptius monachus* L. (*Vultur monachus* L.) *Avvoltoio* P. S. M. Messina, Catania, Palermo.

Ord. GRESSORES

Fam. CICONIIDAE

*Caratteri.* Forme robuste, petto largo, collo di lunghezza media. Becco robustissimo, dritto, più lungo della testa, grosso alla base, intagliato all'estremità. Narici strette, oblunghe scavate nella cornea del becco. Ali lunghe, sub ottuse. Coda mediocre arrotondata. Tarsi lunghi e robusti. Pollice piccolo ma che poggia sul suolo. Unghie larghe ed appiattite. Pelle della faccia nuda e verrucosa.

Gen. *Ciconia* Brisson

- 148 \*\* *Ciconia ciconia ciconia* L. (*Ciconia alba* Bechstein) *Cicogna bianca* L. P. Primavera ed Autunno Lentini e Siracusa.

- 149 \*\* *Ciconia nigra* L. *Cicogna nera* (fig. 86 e 86 a) P. III-IV VIII X. Catania, Marsala.

Fam. IBIDIDAE

*Caratteri.* Becco grosso alla base e appiattito a spatola fino all'estremità nel Gen. *Platalea*, lungo ed arcuato nel Gen. *Plegadis*.

Gen. *Platalea* L.

- 150 *Platalea leucorodia leucorodia* L. *Spatola* (fig. 81) P. Primavera Autunno L. di Siracusa A. altrove.

Gen. *Plegadis* Kaup.

- 151 *Plegadis falcinellus falcinellus* L. (*Ibis falcinellus* L.) *Mignattaio*, *Falcinello* (vignetta) P. Primavera Autunno C. Aprile. Tutta la Sicilia.

Fam. ARDEIDAE

*Caratteri.* Corpo sottile, compresso lateralmente. Collo lungo e sottile. Testa piccola, appiattita. Becco lungo e dritto, profondamente spaccato. Ali ben sviluppate. Coda breve e arrotondata. Tarsi lunghi. Dita lunghe e sottili. Unghia del dito medio dilatata e pettinata sul bordo interno. Pollice lungo, articolato sul prolungamento del dito esterno.

Gen. *Ardea* L.

- 152 (\*\*\*) *Ardea cinerea cinerea* L. *Airone cinerino* Po. P. VII-IX III-IV. Tutta la Sicilia.
- 153 (\*\*\*) *Ardea purpurea purpurea* L. (*Pyrrherodias purpurea* L., *Phoyx purpurea* L.) *Airone rosso* P. Primavera Autunno. Tutta la Sicilia.

Gen. *Egretta* Forster

- 154 *Egretta garzetta garzetta* L. (*Ardea garzetta* L., *Garzetta garzetta* L., *Herodias garzetta* L.) *Garzetta* (fig. 94) I. C. a Catania, L. Pergusa; R. Palermo, Trapani (Mazara).
- 155 *Egretta alba alba* L. (*Herodias alba* L.) *Airone bianco*, *Sgarza* P. Primavera Autunno. I. Po. Messina, Catania, Palermo, Enna (L. Pergusa).

Gen. *Bubulcus* Bonaparte

- 156 *Bubulcus ibis ibis* L. (*Ardeola ibis ibis* L., *Bubulcus ibis* Salvad., *Bubulcus lucidus* Rafinesque) *Airone guarda buoi*, *Airone ibis*, *Sgarza guarda buoi* A. P. Catania in Aprile, Trapani.

Gen. *Ardeola* Boie

- 157 *Ardeola ralloides* Scopoli *Sgarza ciuffetto* C. P. Primavera, Autunno. Tutta la Sicilia.

Gen. *Nycticorax* Forster

- 158 *Nycticorax nycticorax nycticorax* L. (*Nycticorax griseus* L.) *Nitticora*, *Corvo di notte* (fig. 93) S. R. M.

Gen. *Ixbrychus* Billberg

- 159 *Ixbrychus minutus minutus* L. (*Ardeola minuta* L., *Ardetta minuta* L., *Ardea minuta* L.) *Tarabusino*, *Non-notto* E. III-IX C. Tutta la Sicilia.

Gen. *Botaurus* Stephens

- 160 *Botaurus stellaris stellaris* L. *Tarabuso* S. Tutta la Sicilia.

Ord. PHOENICOPTERI

Fam. PHOENICOPTERIDAE

*Caratteri.* Forme slanciate. Collo lunghissimo e flessibile. Becco più lungo della testa, più alto che largo ma ricurvato ad angolo ottuso in basso nella metà inferiore. Tarsi lunghissimi e sottili. Dita anteriori riunite fino alle unghie da una palmatura intagliata al centro. Pollice piccolo toccante appena la terra con l'estremità. Unghie corte, larghe e piatte.

Gen. *Phoenicopterus* L.

- 161 \*\* *Phoenicopterus ruber antiquorum* Temm. (*Phoenicopterus roseus* Pall.) *Fenicoltero*, *Fiammante* A. Catania, Messina, Terranova, Palermo, Lentini, Siracusa, Selinunte (Trapani (vignetta centrale della tavola).

Ord. ANSERES

Fam. ANATIDAE

*Caratteri.* Corpo pesante, raccolto, collo lungo e mobilissimo, ali mediocri che raramente oltrepassano l'estremità della coda. Tarsi brevi con le tre dita anteriori riunite da una membrana intera. Pollice libero munito qualche volta di una piccola membrana natatoria isolata.

Gen. *Cygnus* Bechstein

- 162 \*\* *Cygnur cygnus* L. (*Cygnus musicus* Bechstein) *Cigno selvatico* (fig. 63) A. Inverno Tutta la Sicilia.

Gen. *Anser* L.

- 163 \* *Anser anser* L. (*Anser cinerius* Meyer., *Anser ferus* Shaeff.) *Oca selvatica*, *Oca paglietana* (fig. 61) P. in Marzo e Novembre A. Tutta la Sicilia.
- 164 *Anser falabis falabis* Latham (*Anser sylvestris* Gmelin) *Oca granaiola* Sverna R. Lentini, Messina, Palermo.

Gen. *Tadorna* Flemming

- 165 *Tadorna tadorna* L. (*Anas tadorna* L., *Tadorna cornuta* Gmelin) *Volpoca* (fig. 64) R. P. Inverno. Più comune all'interno dell'isola.

Gen. *Anas* L.

- 166 \* *Anas platyrhynca platyrhyncha* L. *Anas boschas* L. *Germano reale*, *Anitra selvatica*, *Collo verde* (fig. 65) I. L. C. Tutta la Sicilia.
- 167 \* *Anas crecca crecca* L. (*Querquedula crecca* L., *Nettion crecca* L., *Nettion crecca* L.) *Alzavola* (fig. 66) S. I. P. X-III. Tutta la Sicilia.
- 168 \* *Anas querquedula* L. (*Querquedula circia* L., *Querquedula querquedula* L., *Anas circia* L.) *Marzaiola* E. P. Autunno e Primavera II-III.
- 169 *Anas strepera* L. (*Chaulelasmus strepera* L., *Chauliarmus streperus* L.) *Canapiglia* Sverna. Tutta la Sicilia.
- 170 \* *Anas penelope* L. (*Mareca penelope* L.) *Fischione* S. R. Lentini, C. Lago Pergusa.
- 171 \* *Anas acuta acuta* L. (*Dafila acuta* L.) *Codone* Sverna R. L. Caltanissetta, Lentini, Mazara, Marsala, Lago Pergusa.

Gen. *Spatula* Boie

- 172 \* *Spatula clypeata* L. (*Anas clipeata* L.) *Mestolone* (fig. 70) Sverna Catania, Messina, Lago Pergusa.

Gen. *Netta* Kaup.

- 173 \* *Netta rufina* Pallas (*Fuligula rufina* Pall.) *Germano turco*, *Fistione* o *Fischione turco* S. C. a Lentini, più rara altrove, Lago Pergusa.

Gen. *Nyroca* Flemming

- 174 \* *Nyroca ferina ferina* L. (*Fuligula ferina* L., *Fulix ferina* L.) *Moriglione* Inverno IX-IV C. a Lentini e L. Pergusa, R. altrove.
- 175 \* *Nyroca nyroca nyroca* Guldenstadt (*Fulix nyroca* Guld) *Moretta tabaccata* Sverna, A. Messina, Trapani e altrove, C. al L. Pergusa.
- 176 \* *Nyroca fuligula* L. (*Anas fuligula* L., *Fuligula cristata* Leach, *Fuligula fuligula* L., *Fulix fuligula* L.) *Moretta* Sverna X-IV Frequente a Lentini, R. Messina, Catania, L. Pergusa.
- 176 bis \* *Nyroca marila marila* L. *Moretta grigia* I. L. Lentini.

Gen. *Bucephala* Baird

- 177 *Bucephala clangula clangula* L. (*Anas clangula* L., *Clangula glaucion* L. *Clangula clangula* L.) *Quattrocchi* (fig. 67). Sverna Palermo, Catania, Messina, Lago Pergusa.

Gen. *Oxyura* Bonaparte

- 178 *Oxyura leucocephala* Scopoli (*Erismatura leucocephala* Scopoli) *Gobbo rugginoso* (fig. 68) A.

Gen. *Mergus* L.

- 179 *Mergus serrator* L. (*Merganser serrator* L.) *Smergo minore* (fig. 69) P. XI XII III R. Tutta la Sicilia.

Ord. STEGANOPODES

Fam. PHALACROCORACIDAE

*Caratteri.* Becco della lunghezza della testa, grosso, dritto, compresso, spaccato al di là dell'angolo posteriore dell'occhio, a bordi lisci. Mandibola superiore arrotondata e terminante in un uncino. Mandibola

inferiore più breve, tronca. Ali allungate, sub-acute, ricoprenti soltanto la base della coda; questa è lunga, arrotondata, composta di penne rigide, elastiche. Tarsi brevi. Dito medio di un terzo più lungo del tarso e provvisto di un'unghia pettinata, dito esterno più lungo degli altri.

Gen. *Phalacrocorax* Brisson

- 180 \*\*\* *Phalacrocorax carbo carbo* L. (*Phalacrocorax carbo sub-cormoranus* Brehm) *Marangone, Cormorano, Corvo acquatico* (figg. 72-72 a) R. S. litorale dell'isola.
- 181 \*\*\* *Phalacrocorax aristotelis aristotelis* L. (*Phalacrocorax graculus graculus* L. *Marangone col ciuffo* R. S. litorale meridionale, Modica, Siracusa.

Fam. PELICANIDAE

*Caratteri.* I Pellicani sono caratterizzati particolarmente da una enorme tasca inserita sotto la mandibola inferiore e formata dalla membrana elastica di questa regione. Becco dritto, largo depresso, più lungo della testa, spaccato fino all'angolo posteriore dell'occhio. Mandibola superiore molto appiattita uncinata e compressa all'estremità. Faccia nuda. Ali allungate, acute. Coda ampia, leggermente arrotondata. Tarsi brevi e robusti. Unghia del dito medio liscia sul bordo interno.

Gen. *Pelecanus* L.

- 182 *Pelecanus onocrotalus* L. *Pellicano* (figg. 92 e 92 a) A. Tutta la Sicilia.

Ord. TURBINARES

Fam. PROCELLARIIDAE

*Caratteri.* Becco rigonfio e uncinato, composto apparentemente di più pezzi articolati. Narici tubulari. Pollice mancante e sostituito da un'unghia rudimentale.

Gen. *Hydrobates* Boie

- 183 *Hydrobates pelagicus* L. (*Procellaria pelagica* L.) *Uccello delle tempeste* S. C. litorale di tutta la Sicilia.

Gen. *Oceanodroma* Reichenbach

- 184 *Oceanodroma leucorhoa leucorhoa* Vieillot, *Procellaria a coda forcuta, uccello delle tempeste a coda forcuta.*



Fam. PUFFINIDAE

*Caratteri.* Mandibola inferiore appuntita e curvata in basso nel senso della mandibola superiore. Narici aperte all'estremità di due tubi distinti. Tarsi brevi. Dito medio lungo.

Gen. *Puffinus* Brisson

- 185 *Puffinus puffinus puffinus* Brunnich (*Puffinus anglorum* Temminck.) *Berta minore* C. S. Notturmo, Tutto il litorale dell'Isola e L. Pergusa.  
185 bis *Puffinus kuhlii* Boie *Berta maggiore* (fig. 73) S. Coste di tutta l'Isola, L. Pergusa.

Ord. PYGOPODES

Fam. PODICIPIDAE

*Caratteri.* Corpo largo, ovale depresso. Collo allungato e sottile. Testa piccola. Tarsi compressi lateralmente, squamosi. Dita guarnite sui lati di larghe espansioni membranose lobate. Dito esterno più lungo del medio. Unghie larghe ed appiattite. Ali brevi, acute con le penne scapolari uguali o più lunghe delle remiganti. Coda molle.

Gen. *Podiceps* Latham

- 186 *Podiceps cristatus cristatus* L. *Scasso maggiore* (figg. 79 e 79 a) S. ed Invernale Marsala (Trapani), L. Pergusa.  
187 *Podiceps nigricollis nigricollis* Brehm *Scasso piccolo* A. Palermo, Catania, Caltanissetta; C. L. Pergusa.  
188 *Podiceps ruficollis ruficollis* Pallas (*Podiceps fluviatilis* Tunstall.) *Tuffetto* R. S. L. Messina, Palermo, Catania L. Pergusa.

Fam. URINATORIDAE (COLYMBIDAE)

*Caratteri.* Caratteri simili a quelli della famiglia precedente ma con le dita riunite da una membrana interna; il solo pollice lobato al bordo inferiore. Unghie poco appiattite. Tarsi reticolati e non squamosi. Penne scapolari arrivanti appena alla metà delle grandi retrici.

Gen. *Colymbus* L.

- 189 *Colymbus stellatus* Pontoppidan (*Colymbus septentrionalis* L.) *Strolaga minore* (fig. 74) R., Invernale, L. Pergusa.

Ord. COLUMBAE

Fam. COLUMBIDAE

*Caratteri.* Uccelli di medie dimensioni. Corpo raccolto. Testa piccola. Collo e zampe corte. Becco delicato, molle alla base, corneo all'estremità che è arrotondata e più o meno uncinata. Narici a forma di spaccatura longitudinale, tagliate in una spessa membrana e ricoperte da una squama rigonfia e nuda. Ali di lunghezza mediocre, appuntite. Tarsi brevi, squamosi, terminanti in quattro dita di cui tre riunite alla base e dirette in avanti e il quarto libero indietro. Unghie corte e quasi dritte.

Gen. *Columba* L.

- 190 \*\* *Columba livia livia* Gmelin (*Columba livia* Bonnaterre).  
*Piccione selvatico* S. C. Monti e grotte anche sul mare.  
Tutta la Sicilia.
- 191 \* *Columba oenas oenas* L. *Colombella* P. R. S. Autunno.  
Tutta la Sicilia meno la provincia di Palermo.
- 192 \* *Columba palumbus palumbus* L. *Colombaccio* (fig. 58) S.  
Tutta la Sicilia.

Gen. *Streptopelia* Bonaparte

- 193 *Streptopelia turtur turtur* L. (*Turtur comunis* Selby, *Turtur tenera* Brehm) *Tortora* (fig. 57) E. IV X C. Tutta la Sicilia dove nidifica.

Ord. PTEROCLETES

Fam. PTEROCLIDAE

*Caratteri.* Becco mediocre. Ali lunghe, strette ed appuntite con la prima remigante più lunga delle altre che sono gradualmente decrescenti. Coda mediocre, conica con le due retrici mediane allungate e sottili. Tarsi brevi piumati soltanto davanti. Dita nude, le anteriori riunite fino alla prima articolazione da una membrana; pollice rudimentale. Unghie robuste e ricurve.

Gen. *Pterocles* Temminck

- 194 *Pterocles senegallus* L. *Grandule del Senegal* A.

Ord. LIMICOLAE

Fam. BURHINIDAE (OEDICNEMIDAE)

*Caratteri.* Becco della lunghezza della testa o più corto, robusto, triangolare, leggermente depresso alla base, compresso nella metà anteriore. Narici lineari estese fino al centro del becco. Ali medie, acute non raggiungenti l'estremità della coda che è conica, composta di dodici retrici. Tarsi lunghi, sottili, ricoperti di squamette. Dita brevi e robuste, bordate e riunite alla base da una stretta membrana.

Gen. *Burhinus* Illiger

- 195 *Burhinus oediconemus oediconemus* L. (*Oediconemus scolopax* Gmelin) *Occhione* (fig. 82) S. P. IX-X II-III Tutta la Sicilia.

Fam. CURSORIIDAE

*Caratteri.* Becco lungo, un poco più corto della testa, depresso alla base, ricurvo all'estremità. Narici basali, aprentesi in fosse nasali poco profonde. Ali medie acute, coda corta e larga. Tarsi lunghi e gracili, con squame. Dita corte in numero di tre.

Gen. *Cursorius* Latham

- 196 *Cursorius cursor cursor* Latham (*Cursorius gallicus* Gmelin) *Corrione biondo* R. P. Estate, Simeto (Catania), L. Pergusa.

Gen. *Glareola* Brisson

- 197 *Glareola pratincola pratincola* L. *Pernice di mare* (fig. 89) P. Primavera. Frequente nel centro della Sicilia; R. sul litorale.

Fam. CHARADRIIDAE

*Caratteri.* Gambe e collo gracili e lunghi. Piedi sprovvisti di dito posteriore e composti di dita riunite da una membrana come quelli dei Palmipedi. Becco di forma varia. I *Pivieri* hanno il becco più corto della testa, dritto, compresso verso l'estremità. Narici strette, lineari. Tre dita in avanti. Pollice rudimentale o nullo. I *Vanellus* hanno il becco più corto della testa sottile bruscamente rigonfio. Narici lineari, longitudinali. Quattro dita: tre in avanti e uno indietro. Gli *Arenaria* hanno il becco lungo quanto la testa, conico con bordo appiattito ed estremità

dura, compressa. Quattro dita quasi libere, col pollice della lunghezza del tarso. Le **Beccacce**, i **Beccaccini** e i **Chiurli** hanno il becco sempre più lungo della testa, sottile, più o meno cilindrico, flessibile con la mandibola superiore composta di due branche che godono di una grande mobilità e servono da pinze.

Gen. **Charadrius** L.

- 198 Charadrius hiaticula hiaticula L. (*Aegialitis hiaticula* L.) *Corriere grosso* (vignetta) Estivo IV-X P. X e III Tutta la Sicilia.
- 199 Charadrius dubius curonicus Gmelin (*Aegialitis curonica* Gmelin) *Corriere piccolo* S. Tutta la Sicilia.
- 200 Charadrius alexandrinus alexandrinus L. (*Charadrius cantianus* Latham, *Aegialitis cantiana* Latham, *Aegialitis alexandrina* L.) *Fratino* C. S. Messina e altrove.
- 200 bis Charadrius morinellus L. (*Eudromias morinellus* L.) *Piviere tortolino* P. Primavera, Autunno Trapani.
- 201 \* Charadrius apricarius apricarius L. (*Charadrius pluvialis* L., *Pluvialis apricarius* L.) *Piviere dorato* P. X-XI III-IV. Tutta la Sicilia.

Gen. **Squatarola** Cuvier

- 202 \* *Squatarola squatarola squatarola* L. (*Squatarola helvetica* L.) *Pivieressa* Invernale e P. Primavera e Autunno Messina, Catania, Palermo, Trapani.

Gen. **Vanellus** Brisson

- 203 (\*\*) *Vanellus vanellus* L. (*Vanellus cristatus* Meyer, *Vanellus vulgaris* Bechstein) *Pavoncella* (fig. 85) C. Invernale P. Autunno, Primavera. Tutta la Sicilia.

Gen. **Arenaria** Brisson

- 204 *Arenaria interpres interpres* L. (*Strepsilas interpres* L.) *Voltapietre* A. Catania e Messina.

Gen. **Calidris** Pontopiddan

- 205 *Calidris ferruginea* Pontopiddan (*Tringa ferruginea* Brünnich, *Tringa subarquata* Gùldenstadt, *Pelidna subarquata* Gùld.) *Piovanello* I. X-III C. a Lentini. Frequente altrove.

- 206 \* *Calidris alpina alpina* L. (*Tringa alpina* L., *Pelidna cinclus* Cuvier, *Pelidna alpina* L.) *Piovanello pancia nera* R. I. VIII-III Trapani, Enna.
- 207 \* *Calidris minuta* Leisler (*Tringa minuta* Leisler, *Pelidna minuta* Leisler *Actodromus minuta* Leisler) *Gambecchio*, *Ciurletto* P. Primavera Autunno.
- 208 \* *Calidris temminckii* Leisler (*Pelidna temminckii* Leisler, *Tringa temminckii* Leisler, *Limonites temminckii* Leisler) *Gambecchio nano* P. Primavera Autunno C. Pergusa, Catania e Messina. Scarsa Palermo.

Gen. *Philomachus* L.

- 209 \* *Philomachus pugnax* L. (*Machetes pugnax* L.) *Combatente*, *Gambetta* C. P. IV e X. Tutta la Sicilia.

Gen. *Crocethia* Billberg

- 210 \* *Crocethia alba* Pallas (*Calidris arenaria* L.) *Calidra* (fig. 84) P. IV-V IX-X. Tutta la Sicilia.

Gen. *Tringa* L.

- 211 *Tringa erythropus* Pallas (*Totanus fuscus*) L. *Totano moro*, *Chiò-chiò*, *Gambetta fosca* R. P. Tutta la Sicilia.
- 212 *Tringa stagnatilis* Bechstein (*Totanus stagnatilis* Bechstein) *Albastrello*, *Piro-piro gambe lunghe* R. P. Primavera Autunno Mazara del Vallo, Pergusa.
- 213 *Tringa totanus totanus* L. (*Totanus calidris* L.) *Pettegola* P. Primavera, Autunno. Tutta la Sicilia.
- 214 \* *Tringa nebularia* Gunnerus (*Totanus canescens* Gmelin, *Totanus nebularius* Gunnerus) *Pantana* R. P. VII-IX III-V Palermo.
- 215 *Tringa ochropus* L. (*Helodromas ochropus* L., *Totanus ochropus* L.) *Piro-piro culbianco* C.P. Primavera. Autunno Tutta la Sicilia.
- 216 *Tringa glareola* L. (*Totanus glareola* Gmelin) *Piro-piro boschereccio* C. P. Primavera, Autunno. Tutta la Sicilia.
- 217 *Tringa hypoleucos* L. (*Actitis hypoleucos* L., *Totanus hypoleucos* L., *Tringoides hypoleucos* L.) *Piro-piro piccolo* C. P. IV VIII IX. Tutta la Sicilia.

Gen. **Himantopus** Brisson

- 218 *Himantopus himantopus himantopus* L. (*Himantopus candidus* Bonnaterre). *Cavaliere d'Italia* (figg. 90 e 90 a) P. III IX-X Catania, Messina L. Pergusa.

Gen. **Recurvirostra** L.

- 218 bis *Recurvirostra avocetta avocetta* L. (*Recurvirostra avocetta* L., *Himantopus avocetta* L.) *Avocetta* (fig. 83) A. Prov. Trapani.

Gen. **Limosa** Brisson

- 219 *Limosa limosa lapponica* L. (*Limosa rufa* Leach) *Pittima minore* R. A.

Gen. **Numenius** Brisson

- 220 \* *Numenius arquata arquata* L. *Chiurlo maggiore, Chiurlo* (fig. 78) P. VIII-X III-V Siracusa, Catania, Enna.  
221 *Numenius tenuirostris* Vieillot *Chiurlottello* C. Sverna P. III-IV e XI. Tutta la Sicilia.

Gen. **Scolopax** L.

- 222 (\*) *Scolopax rusticola rusticola* L. *Beccuccia* (fig. 80) I. IX-III C. Tutta la Sicilia.

Gen. **Capella** Frenzel

- 223 \* *Capella gallinago gallinago* L. (*Gallinago scolopacina* Bp. *Gallinago coelestis* Frenzel) *Beccaccino reale* (fig. 88) I. VIII-III P. II-III C. Tutta la Sicilia.  
224 \* *Capella media* Latham (*Gallinago media* Latham, *Gallinago major* Gmelin) *Croccolone* P. Primavera, Autunno I. X-III. Tutta la Sicilia.

Gen. **Lymnocyptes** Kaup.

- 225 \* *Lymnocyptes minimus* Brünnich (*Lymnocyptes gallinula* L., *Gallinago gallinula* L.) *Frullino, Beccaccino minore* I. X-III P. Tutta la Sicilia.

Ord. LARI

Fam. LARIDAE

*Caratteri.* Becco solido uncinato. Narici mediocri. Coda generalmente pari o intagliata.

Gen. *Chlidonias* Rafinesque

- 226 *Chlidonias nigra nigra* L. (*Hydrochelidon nigra nigra* L., *Sterna nigra* L.) *Mignattino* E. Doppio passo. Tutta la Sicilia.
- 227 *Chlidonias leucoptera* Temminck (*Hydrochelidon leucoptera* Schinz.) *Mignattino ali bianche* R. E. Doppio passo. Tutta la Sicilia.

Gen. *Gelochelidon* Brehm

- 227 bis *Gelochelidon nilotica nilotica* Gmelin (*Sterna anglica* Montagu, *Gelochelidon anglica* Montagu) *Rondine di mare a zampe nere*, *Beccapesci inglese* R. Litorale dell'Isola.

Gen. *Sterna* L.

- 228 *Sterna caspia* Pallas (*Hydroprogne caspia* Pallas, *Sylochelidon caspia* Pall) *Beccapesci maggiore* R. A. Palermo, Messina, Catania, più frequente Lentini e Siracusa.
- 229 *Sterna sandvicensis sandvicensis* Latham (*Sterna cantiaea* Gmelin, *Thalasseus cantiaeus* Gmelin) *Beccapesci* (fig. 75) R. A. Palermo, Messina, Catania, Lentini, Siracusa.
- 230 *Sterna hirundo hirundo* L. (*Sterna fluviatilis* Naum.) *Rondine di mare*. Frequente nella piana di Catania e a Mazara (Trapani), L. Pergusa (Enna).
- 231 *Sterna albifrons albifrons* Pallas (*Sterna minuta* L., *Sternula minuta* L.) *Fratricello* (fig. 76) P. IV-V IX. Litorale tutta la Sicilia.

Gen. *Larus* L.

- 232 *Larus marinus* L. *Mugnaiaccio* A. Scicli.
- 233 *Larus argentatus michahellesii* Bruch (*Larus argentatus cachinnans* Pall., *Larus argentatus Pontoppidan*, *Larus cachinans* Pall.) *Gabbiano reale* (fig. 77) S. Frequente. Tutta l'Isola (litorale).

- 234 *Larus canus canus* L. *Gaviana* S. I. IX-III C. Catania  
Messina.
- 235 *Larus melanocephalus* Temminck, (*Chrocephalus melano-*  
*cephalus* Nitt.) *Gabbiano corallino* C. S. Litorale di tutta  
l'Isola.
- 236 *Larus Genei* Breme (*Larus gelastes* Lichtenstein, *Gelastes*  
*Genei* de Breme) *Gabbiano roseo* R.
- 237 *Larus minutus* Pallas (*Chrocephalus minutus* Pallas)  
*Gabbianello* C. I. Messina e altrove (litorale).
- 238 *Larus ridibundus ridibundus* L. (*Chrocephalus ridibun-*  
*dus* L.) *Gabbiano comune* C. S. VIII-IV. Tutta la Sicilia  
(litorale).

Gen. *Rissa* Stephens

- 239 *Rissa tridactyla tridactyla* L. *Gabbiano tridattilo* R. E.  
Catania.

Fam. STERCORARIIDAE

*Caratteri.* Becco un poco meno lungo della testa, robusto con la mandibola superiore terminante con un uncino apparentemente sovrapposto; mandibola inferiore angolosa. Narici laterali, lineari, oblique più vicine all'estremità del becco che alla base. Ali allungate, appuntite. Coda ineguale, con le due retrici mediane spesso molto lunghe. Tarsi mediocri e sottili della lunghezza del dito medio. Pollice breve, appena arrivante al suolo. Unghie grandi e uncinatate.

Gen. *Stercorarius* Brisson

- 240 *Stercorarius parasiticus parasiticus* L. (*Stercorarius cre-*  
*pidatus* Bauchs) *Labbo* A. Catania.
- 241 *Stercorarius longicaudus* Vieillot (*Stercorarius parasi-*  
*ticus* L.) *Labbo a coda lunga* A. Siracusa.

Ord. ALECTORIDES

Fam. OTIDIDAE

*Caratteri.* Becco più corto della testa, robusto, alto e largo alla base; mandibola superiore ricurva dalle narici alla estremità che è intagliata; mandibola inferiore rettilinea. Narici basali, ellittiche, apertesi sulla membrana che circonda la base del becco. Tarsi di lunghezza doppia del dito medio. Dita brevi e robuste, riunite alla base e contornate da una stretta membrana rugosa.



Gen. *Otis* L.

- 242 \* *Otis tarda tarda* L. *Ottarda* A. Autunno Primavera.  
343 \* *Otis tetrax tetrax* L. (*Tetrax tetrax* L.) *Gallina pralatiola*  
(fig. 60) S. C. L. Lentini, Trapani.

Fam. GRUIDAE

*Caratteri.* Collo lungo e sottile. Testa piccola e graziosa. Becco della lunghezza della testa, dritto, appuntito, un poco compresso sui lati. Narici mediane, allungate, comunicanti fra loro. Quattro dita: le anteriori mediocrementemente lunghe; l'esterno e il medio uniti alla base da una stretta membrana; pollice mediocre, toccante il suolo con la sua estremità.

Gen. *Megalornis* Gray

- 244 \*\* *Megalornis grus grus* L. (*Grus cinerea* Bechstein, *Grus grus* L.) *Gru* (vignetta) P. Autunno inverno. Tutta la Sicilia.

Gen. *Antropoides* L.

- 245 \* *Antropoides virgo* L. *Gru damigella* (vignetta) R. Palermo, Agrigento, Siracusa.

Fam. RALLIDAE

*Caratteri.* Corpo compresso lateralmente, testa piccola, collo sottile di lunghezza media. Becco compresso, raramente più lungo della testa. Zampe robuste. Tarsi mediocri. Quattro dita di cui il medio della lunghezza del tarso, pollice ben sviluppato.

Gen. *Rallus* L.

- 246 \* *Rallus aquaticus aquaticus* L. *Porciglione*, *Rallo acquatico*, *Gallinella* C. S. L. P. in Primavera. Tutta la Sicilia.

Gen. *Porzana* Vieillot

- 247 \* *Porzana porzana* L. (*Gallinula porzana* L., *Porzana maruetta* Leach., *Orthygometra porzana* L.) *Voltolino* E. Tutta la Sicilia.  
248 *Porzana parva* Scopoli (*Porzana minuta*, *Zapornia parva*, Scopoli, *Orthygometra parva* Scop.) *Schiribilla* S. E. P. III-IX. Tutta la Sicilia.

- 249 Porzana pusilla intermedia Hermann (Porzana bailloni Vieillot) *Schiribilla grigiata* P. Aprile e Novembre S. nel centro dell'Isola. Tutta l'Isola.

Gen. **Crex** Bechstein

- 250 \* *Crex crex crex* L. (*Crex pratensis* Bechstein) *Re di quaglie* P. IV-V IX-X. Catania e Messina. Rara altrove.

Gen. **Gallinula** Brisson

- 251 \* *Gallinula chloropus chloropus* L. *Gallinella d'acqua* S. L. Tutta la Sicilia.

Gen. **Porphyrio** Brisson

- 252 \* *Porphyrio caeruleus* Vandelli *Pollo sultano* (vignetta) Nidifica a Lentini A. altrove.  
253 \* *Porphyrio madagascariensis* Lath. *Pollo sultano a schiena verde* S. Paludi.

Gen. **Fulica** L.

- 254 \* *Fulica atra atra* L. *Folaga* (figg. 87 e 87a) U. S. L. P. IV e VIII.  
255 *Fulica cristata* Gmelin *Folaga crestata*, *Folaga cornuta* (fig. 62) A. I. X-III Bicocca, Lentini.

Ord. **HEMIPODII** (Turnices)

Fam. **TURNICIDAE**

*Caratteri.* Becco gracile, quasi dritto. Narici oblunghe, prolungantesi fino al centro del becco. Tarsi gracili, terminanti in tre dita dirette in avanti, pollice mancante. Unghia sottili, appuntite e leggermente ricurve.

Gen. **Turnix** Bonnaterre

- 256 \* *Turnix sylvatica sylvatica* Desfontaines *Quaglia tridattila* R. S. Catania, Siracusa, Palermo.

Ord. GALLI

Fam. PHASIANIDAE

*Caratteri.* Becco breve, compresso all'estremità, con la mandibola superiore ricurva. Narici basali, laterali, strette, aprentesi su una squama membranosa. Tarsi sottili, lisci. Dita riunite alla base da una membrana; pollice breve e sollevato. Unghie corte, mediocrementemente curve.

Gen. *Alectoris* Kaup.

- 257 \*\* *Alectoris graeca saxatilis* Meyer e Wolf. (*Caccabis saxatilis* Meyer, *Perdrix saxatilis* Meyer) *Coturnice* S. C. M. Tutta la Sicilia.

Gen. *Coturnix* Bonnaterre

- 258 \* *Coturnix coturnix coturnix* L. (*Coturnix communis* Bonnat.) *Quaglia* (fig. 59) C. P. S. Tutta la Sicilia.

*Corrigendum:* pag. 21, 1° rigo della colonna a destra, leggasi **Passaru** e non **Passera**.

## BIBLIOGRAFIA

- ARRIGONI DEGLI ODDI ETTORE — *Testo esplicativo ed illustrativo delle disposizioni vigenti in materia venatoria.*
- ASSENZA VINCENZO — *Dizionario Zoologico Siciliano-Italiano.* Modica 1928.
- BIUNDI GIUSEPPE — *Dizionario Siciliano Italiano.* Palermo 1857.
- DODERLEIN PIETRO — *Avifauna del Modenese e della Sicilia.*
- HARTERT ERNST — *Die Vogel der palaarktischen Fauna.* Berlin 1910-1923.
- MALHERBE ALFRED — *Faune Ornithologique de la Sicile.* (Mém. Acad. royale de Metz, 1842-1843).
- MARTORELLI GIACINTO — *Gli uccelli d'Italia.* Milano 1931.
- MASSA CARLO — *Gli uccelli della Sicilia.* Nat. Sic. A. -1891 pag. 193.
- MORTILLARO VINCENZO — *Nuovo Dizionario Siciliano-Italiano.* Palermo 1838-844.
- NICOTRA E. D'URSO — *Nuovissimo Diz. Siciliano-Italiano.* Catania.
- PASQUALINO MICHELE — *Vocabolario Siciliano Etimologico Italiano e Latino.* Palermo 1785.
- RIGGIO S. e DE STEFANI T. — *Appunti e note di Ornitologia Siciliana.* Nat. Sic. A. XIV p. 113, 29-39, 75-83.
- TRAINA ANTONIO — *Nuovo Vocabolario Siciliano-Italiano.* Palermo 1868.

TAVOLA E SPIEGAZIONI

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA

	*	**		*	**
Fig. 1 — Nocciolaia	5	cm. 30	Fig. 52 — Pojana	134	cm. 52-53
» 2 — Corvo Imperiale	1	» 57	» 53 — Aquila del Bon.	132	» 68-74
» 3 — Gazza	6	» 42	» 54 — Grifone	146	» 100
» 4 — Taccola	4	» 31	» 55 — Avvoltoio degli agnelli	144	» 108
» 5 — Corvo nero	3	» 43	» 56 — Gheppio	131	» 32
» 6 — Lucarino	17	» 11	» 57 — Tortora	193	» 30
» 7 — Verzellino	19	» 11, 5	» 58 — Colombaccio	192	» —
» 8 — Frosone	14	» 17	» 59 — Quaglia	258	» 18-20
» 9 — Occhiocotto	74	» 14	» 60 — Gallina prataiola	243	» 78
» 10 — Crociere	21	» 17, 5	» 61 — Oca selvatica	163	» 80
» 11 — Passera sarda	26	» 16	» 62 — Folaga cornuta	255	» 35
» 12 — Strillozzo	28	» 19	» 63 — Cigno	162	» 105
» 13 — Codibugnolo sic.	55	» 12	» 64 — Volpoca	165	» 57, 5
» 14 — Cappellaccia	39	» 17	» 65 — Germano reale	166	» 52, 5
» 15 — Pispolone	43	» 15	» 66 — Alzavola	167	» 32
» 16 — Cutrettola	47	» 15-19	» 67 — Quattrocechi	177	» 49
» 17 — Ballerina	48	» 18	» 68 — Gobbo rugginoso	178	» 41, 2
» 18 — Cinciallegra	53	» 13	» 69 — Smergo minore	179	» 54, 5
» 19 — Averla capirossa	57	» 19	» 70 — Mestolone	172	» 43, 5
» 20 — Culbianco	87	» 15	» 71 — Moretta grigia 176bis	»	» 53
» 21,21a — Tordo	80	» 21	» 72,72a — Marangone	180	» 81
» 22 — Gracchio corall.	8	» 35	» 73 — Berta maggiore 185bis	»	» 47
» 23 — Storno roseo (adulto)	»	» 21	» 74 — Strolaga minore	189	» 57
» 24 — » (giovane)	8	» —	» 75 — Beccapesci	229	» 37, 5
» 25 — Rigogolo	13	» 22	» 76 — Fraticello	231	» 20, 5
» 26 — Picchiotto	52	» 13, 5	» 77 — Gabbiano reale	233	» 57, 5
» 27 — Rampichino	50	» 19	» 78 — Chiurlo	220	» 48
» 28 — Lui verde	66	» 12	» 79,79a — Svasso magg.	186	» 55
» 29 — Sericciolo	100	» 9	» 80 — Beccaccia	222	» 25, 5
» 30 — Merlo (femmina)	84	» 24	» 81 — Spatola	150	» 72
» 31 — Rondine	102	» 21	» 82 — Occhione	195	» 38, 2
» 32 — Balestruccio	103	» 13-14	» 83 — Avocetta 218bis	»	» 36, 6
» 33 — Picchio muraiuolo	51	» 14	» 84 — Calidra	210	» 16, 8
» 34 — Fiorrancino	56a	» ?	» 85 — Pavoncella	203	» 50
» 35 — Stiaccino	91	» 13	» 86,86a — Cicogna nera	149	» 86, 5
» 36 — Gruccione	109	» 23	» 87,87a — Folaga	254	» 70
» 37 — Upupa	110	» 25	» 88 — Beccaccino	223	» 21, 6
» 38,38a — Martin pescatore	112	» 17	» 89 — Pernice di mare	197	» 25
» 39,39a — Rondone alpino	106	» 23	» 90,90a — Cavaliere d'I- talia	218	» 33
» 40 — Succiacapre	108	» 26	» 91 — Pulcinella di mare (1)	»	» 30, 5
» 41 — Picchio verde	113	» 31	» 92,92a — Pellicano	182	» 150
» 42,42a — Torcicollo	117	» 17	» 93 — Nitticora	158	» 52, 5
» 43 — Cuculo	118	» 31	» 94 — Garzetta	154	» 53, 5
» 44 — » col ciuffo	119	» 39,5	» 95 — Barbagianni	125	» 34
» 45 — Picchio minore	116	» 14			
» 46 — Gufo	122	» 34, 5			
» 47 — Allocco 124bis	»	» 39, 5			
» 48 — Assiolo	121	» 19			
» 49 — Civetta	124	» 24			
» 50,50a — Falco pellegrino	126	» 40-50			
» 51 — Lodolaia	128	» 30-34			

Vignetta del centro.






A sinistra, dal primo piano: Corriere grosso, Gru damigella, Pollo sultano e coppia di Fenicotteri. A destra Mignattaio e Gru.

\* Numeri progressivi delle Specie nella parte sistematica.

\*\* Lunghezza media del corpo, misurata in centimetri, dall'estremità del becco all'estremità della coda.

(Le figure non sono disegnate in proporzioni alle dimensioni per ragioni di spazio).

(1) Il Pulcinella di mare è stato visto una sola volta accidentalmente nelle acque dello Stretto di Messina.



## INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

- (\*) Selvaggina stanziale protetta.
- \* Specie di interesse venatorio.
- \*\* » delle quali è vietata la caccia.
- (\*\*) » utili all'agricoltura e da proteggersi.
- \*\*\* » dannose all'agricoltura ed alla selvaggina.
- (\*\*\*) » dannose alla piscicoltura.
- A. Cattura accidentale.
- C. Specie comune.
- Ca. » comunissima.
- E. » estiva.
- I. » ibernante.
- L. Laghi, stagni e paludi.
- M. Monti.
- P. Specie di passo.
- Pi. » » » irregolare.
- Po. Pianure.
- R. Specie rara.
- S. » stanziale.

I numeri romani che seguono la lettera P. indicano i mesi dell'anno in cui le specie passano dalla Sicilia; quelli che seguono le lettere I. ed E. indicano il mese di arrivo e quello di partenza delle specie ibernanti ed estive.

I nomi volgari italiani sono scritti in corsivo.

Le indicazioni di località capilungo di Provincia indicano la presenza delle specie in tutta la Provincia.