

Estratto dalla *Rivista Italiana di Ornitologia* - Anno XLII, Serie II

---

ANGELO PRIOLO

---

**Brevi note ornitologiche  
dalla Sicilia orientale**



MILANO

---

1972

ANGELO PRIOLO

## Brevi note ornitologiche dalla Sicilia orientale

Mi sembra utile far conoscere alcune notizie inedite inerenti a catture e osservazioni di uccelli non comuni effettuate sia di recente che in passato nella Sicilia orientale.

Cicogna nera - *Ciconia nigra* (LINNEO).

L' incontrai due volte: il 3/IX/1951 un individuo isolato che sorvolava i monti di Alcara Li Fusi (Messina); il 5/V/1954 un gruppetto di tre nel lago Gurrída, presso Randazzo (Catania).

Ne conservo una ♀ giovane raccolta a Giarre (Catania) il 25/X/1964.

Aquila anatraia minore - *Aquila pomarina pomarina*, C. L. BREHM.

Un giovane ♂ è stato abbattuto il 29/IX/1969 nel vallone di Cavagrande, presso S. Alfio (Catania). Le misure rilevate sull'esemplare sono: becco mm. 38; ala mm. 480. Non mi è stato possibile ottenere l'esemplare per la raccolta, perciò mi limito a presentarne la riproduzione fotografica a documentazione della cattura.

Di questa specie non conosco altre segnalazioni per la Sicilia oltre a quella di GIAMBONA apparsa su questa Rivista nel 1970 a pag. 118, riferita all' isola di Ustica.

Smeriglio - *Falco columbarius aesalon*, TUNSTALL.

Ne conservo un ♂ adulto, ucciso alla Piana di Catania il 3/I/1953. Personalmente vidi questo falchetto in natura una volta sola presso Randazzo il 16/I/1953. In raccolta ne conservo pure un esemplare molto vecchio, cedutomi dal compianto Dott. A. Trischitta, proveniente dalla collezione Pistone, caturato, a quanto risulta dal cartellino, nel luglio 1872 nella Sicilia occidentale.




Fig. 1. — Aquila anatraia minore uccisa presso S. Alfio il 29/IX/1969.

Otarda - *Otis tarda tarda*, LINNEO.

Ne conservo un ♂ adulto ucciso a Trepunti, presso Giarre (Catania), nel marzo 1949. Consultando le liste compilate dal Prof. MOLTONI, apparse su questa Rivista nel 1968 pagg. 223-234, nel 1969 pagg. 55-56, e nel 1971 pagg. 128-130, mi accorgo che per la Sicilia vi sono solo tre segnalazioni, tutte riferite al secolo scorso.

Cuculo dal ciuffo - *Clamator glandarius* (LINNEO).

In aggiunta alle notizie riepilogative, relative a questa specie, recentemente apparse su questa Rivista, segnalo i seguenti tre esemplari attualmente presenti nella mia raccolta: 1) giovane, 5/III/1955 S. Francesco la Rena, presso Catania; 2) adulto, III/1962 Giarre; 3) ♂ adulto, 15/II/1968 Randazzo.

Gufo reale - *Bubo bubo bubo* (LINNEO).

Non ebbi mai occasione di osservare questa grossa specie. Ne conservo un esemplare investito da un'auto nel novembre 1954 presso Enna. Nel giugno 1964 il mio amico Sig. Luigi Lino ebbe un individuo pure travolto da un'auto nei boschi della Miraglia, presso Cesarò (Messina); non fu possibile prepararlo perchè, essendo rimasto diversi giorni sul ciglio della strada, era già in avanzato stato di decomposizione, perciò ne fu conservato solo lo scheletro.

Rondine rossiccia - *Hirundo daurica rufula*, TEMMINCK.

Nell'estate 1970 e precisamente dalla fine del mese di giugno a tutto agosto ebbi modo di osservare quasi giornalmente nei pressi di Calatabiano (Catania) e precisamente nel cantiere della costruenda autostrada Messina Catania, un gruppetto composto da una quindicina di individui. Le Rondini rossicce erano molto confidenti e spesso si posavano per raccogliere il fango sui rilevati che, per evitare la polvere, venivano continuamente annaffiati. Non ho avuto occasione di osservare alcun nido, ma son quasi certo che abbiano nidificato nelle vicinanze.

Ne conservo un esemplare raccolto a Punta Faro, presso Messina, nel maggio 1960.

Averla maggiore - *Lanius excubitor excubitor*, LINNEO.

L' incontrai una volta sola il 27/XII/1949 presso Randazzo; si tratta di una ♀ che raccolsi e tuttora conservo.

Sordone - *Prunella collaris collaris* (SCOPOLI).

A proposito di questa specie, oltre a quanto ha scritto ORLANDO su questa Rivista nel 1967 a pag. 61, mi sembra utile aggiungere quanto in precedenza io avevo pubblicato in un articolo apparso su « Venatoria Sicula » nel n. 4 del 28/II/1965 a pag. 62. In tale scritto comunicavo di aver incontrata diverse volte la specie in Sicilia, in gruppetti di una diecina di individui ciascuno, in due distinte località del gruppo dei Monti Nebrodi, precisamente sui costoni di Malvagna e sulle Rocche del Crasto vicino Alcara

Li Fusi, e di aver raccolto a documentazione di tali incontri i seguenti tre esemplari: 1) ♂ 19/XI/1952 Malvagna; 2) 17/XI/1955 stessa località; 3) 14/XI/1958 Rocche del Crasto.

Successivamente li osservai di nuovo alle Rocche del Crasto il 19/XI/1967 ed il 16/II/1968, in quest'ultima occasione ne raccolsi un altro esemplare.

Picchio muraiolo - *Tichodroma muraria muraria* (LINNEO).

Non incontrai mai questa specie; ne conservo un esemplare cedutomi dal Trischitta che lo preparò, raccolto in contrada Malocugno presso Novara di Sicilia (Messina) il 19/II/1957.

Pendolino - *Remiz pendulinus pendulinus* (LINNEO).

Lo vidi per la prima volta, e ne raccolsi un ♂ che conservo, il 31/III/1949 nelle paludi presso la foce del Simeto. Nella primavera del 1961 il mio amico e compagno di caccia Sig. Mario Sernagiotto ne udì il richiamo tra la vegetazione del lago Gurrída presso Randazzo dove, l'anno successivo, precisamente il 31 marzo, ne raccolse due, ♂ e ♀, che sono conservati nella mia raccolta e ne vedemmo diversi altri.

Organetto minore - *Acanthis flammea cabaret* (MÜLLER).

Conservo una ♀ catturata con le reti nel novembre 1966 presso Acireale (Catania) e tenuta in gabbia dal Sig. Sernagiotto sino al successivo marzo 1967.

Trombettiere - *Rhodopechys githaginea zedlitzi* (NEUMANN).

Altre due comparse si aggiungono a quella da me segnalata su questa Rivista nel 1956 a pag. 37. Nella mia raccolta ne conservo una ♀ catturata con le reti nei dintorni di Catania nella primavera 1967 e vissuta due anni nella voliera del Sig. Sernagiotto, ove attualmente esiste un'altra ♀ catturata nella piana di Catania nella primavera 1971. Entrambi questi esemplari, secondo quanto ha riferito chi li ha catturati, erano imbrancati con Verdoni.

In mancanza di materiale di confronto penso che i suddetti esemplari debbano appartenere alla forma occidentale, la cui area di distribuzione si avvicina maggiormente alla Sicilia.



Fig. 2. — Trombettiere catturato presso Catania nella primavera 1971.

Zigolo capinero - *Emberiza melanocephala*, SCOPOLI.

Ne conservo un  $\delta$  catturato a S. Giuseppe la Rena presso Catania e vissuto due anni nella voliera del Sig. Sernagiotto. Personalmente non ebbi mai occasione di osservare la specie in Sicilia.

Zigolo minore - *Emberiza pusilla*, PALLAS.

Anche di questa specie possiedo un esemplare catturato a Ognina presso Catania nel settembre 1958 e vissuto nella voliera del Sig. Sernagiotto sino al novembre 1960; questo individuo presenta tracce di albinismo acquistate durante la schiavitù.

Catania, aprile 1972.