

NIDIFICAZIONE DI FISTIONE TURCO, *NETTA RUFINA*, E RIPRODUZIONE DI CUCULO DAL CIUFFO, *CLAMATOR GLANDARIUS*, IN SICILIA (ITALY)

ABSTRACT – *Breeding of Red-crested Pochard, Netta rufina, and of Great-spotted Cuckoo, Clamator glandarius, in Sicily (Italy).*

Fistione turco, *Netta rufina*

In Sicilia il Fistione turco (“re di munacuna” o “anatra turca” nel dialetto locale), era ritenuto comune nel periodo migratorio e in inverno (DODERLEIN, 1869-74; GIGLIOLI, 1907) e segnalato come nidificante, sin dalla prima metà dell'Ottocento, da BENOIT (1840) al Biviere di Lentini, dove l'ultima conferma di nidificazione risale al 1943 (STRESEMANN, 1943). In tempi più recenti IAPICHINO & MASSA (1989) lo considerano migratore irregolare scarso e parzialmente svernante. Negli ultimi anni le segnalazioni nell'Isola sono state sporadiche (tra queste: 16 svernati nell'inverno 1992-1993 nel Biviere di Lentini; CIACCIO, 1994), tranne presso le saline di Siracusa dove lo svernamento di alcuni individui si registra praticamente ogni anno (IENTILE & BAGLIERI, 1997; BRICHETTI & FRACASSO, 2003). Nella Riserva Naturale Integrale di Vendicari è ritenuto di comparsa irregolare nel periodo migratorio con pochi esemplari e, occasionalmente, anche svernante (GATTO & RESTUCCIA, 1999).



Fig.1 - Pantano Leone, femmina di Fistione turco con parte della nidiata.

Dati inediti da me raccolti sulla fascia costiera sud-occidentale della Sicilia riguardano: la cattura di una coppia nella palude di "Torre Sibiliana" (fra contrada Terrenove di Marsala e Margi Spanò-Capo Feto; 37.48N - 12.30E), nel novembre del 1973; 3 femmine e un maschio catturati contemporaneamente nel lago Preola di Mazara del Vallo (37.38N - 12.38E), nel 1976, da Lorenzo Monsignore e, successivamente, altre 4 catture nella stessa località: 3 nel 1986 e una nel gennaio 1987.

L'alta pressione venatoria che fino al 1999 si è registrata al lago Preola, con continui atti di bracconaggio, e il fatto che lo stesso lago, a partire dal 1982, si è prosciugato annualmente nel periodo estivo, potrebbero essere la causa dell'irregolarità della presenza del Fistione turco. Il ripristino del lago Preola, dal 1998 Riserva Naturale Integrale, aiuterebbe a comprendere l'importanza di questa area per la specie.

Nel pantano Leone (37.39N - 12.41E) di Campobello di Mazara, il 30 marzo 2004, in seguito alla preclusione dell'accesso alla parte nord (la più riparata e protetta), si è insediata una coppia di fistioni turchi (osservati successivamente anche da Andrea Ciaccio e da Giuseppe Rannisi). Nella prima decade di aprile la femmina ha iniziato ad appartarsi nella vegetazione a nord-est del pantano. Dal 27 aprile, non è stato più osservato il maschio. Il 23 maggio, alle ore 20 circa, nella parte est dello stagno, al limite del folto fragmiteto, ho rilevato la femmina con 10 *pulli*, apparentemente di due settimane di età, al seguito. Ciò mi ha indotto a ritenere che il maschio, come normalmente accade, abbia lasciato il sito di nidificazione prima della schiusa. Dei 10 nuovi nati, solo 4 sono giunti all'involo e due di essi, verso le 20 del 13 luglio, sono stati osservati al vicino lago Preola.

Cuculo dal ciuffo, *Clamator glandarius*

In Sicilia il Cuculo dal ciuffo (localmente "re di cucchi di maiu", ossia re dei cuculi di maggio) è considerato raro durante la migrazione primaverile, non segnalato nella maggior parte degli anni (IAPICHINO & MASSA, 1989).

Dati inediti in mio possesso, relativi alla fascia costiera che va dalla piana di San Nicola di Mazara (dove è compresa la depressione del Lago Preola e dei Gorghi Tondi) all'area retrodunale della foce del fiume Belice (37.37N - 12.38E; 37.35N - 12.52E), non concordano con quanto riportato in letteratura. In base a osservazioni personali, il Cuculo dal ciuffo risulta regolarmente presente, in migrazione, nelle dune di sabbia di contrada Frascia, a Sud-Est di Campobello di Mazara, dove ha però risentito della riduzione dei mandorli e dei sugheri che caratterizzavano la zona. Ogni anno, comunque, nella pineta, a circa un chilometro dalla Riserva Naturale Integrale Lago Preola e Gorghi Tondi (37.37N - 12.38E), nel periodo aprile-maggio se ne può osservare un paio. Il 9 maggio 2003 un individuo è stato segnalato nei pressi del pantano Leone di Campobello di Mazara (37.39N - 12.41E), a meno di due chilometri in linea d'area da Frascia (Alessandro Andreotti e Lorenzo Serra, com. pers.).

Intorno a fine aprile-inizio maggio del 2004, un cuculo dal ciuffo deve aver deposto in un nido di Gazza, *Pica pica*, in una pineta a circa 700 metri di distan-

za dal lago Preola, perché in data 23 maggio, alle ore 11,40, con pioggia a intermittenza ho osservato e fotografato un giovane individuo ai primi voli, sia lungo il muro merlato che cinge la pineta, sia su una vicina antenna televisiva, insieme alla gazza che lo ha allevato. Successivamente ho di nuovo incontrato il soggetto a sud del Gorgo Lentini (RNI Lago Preola e Gorgi Tondi), circa due chilometri a est dal luogo di nascita. In base ai nuovi dati acquisiti, il Cuculo dal ciuffo, nella fascia costiera sud-occidentale della Sicilia, risulta essere di passo scarso, ma regolare e occasionalmente nidificante.

BIBLIOGRAFIA

- BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2003 - Ornitologia italiana. Vol. 1 - *Alberto Perdisa Editore*, Bologna.
- BENOIT L., 1840 - Ornitologia Siciliana - *Stamperia G. Fiumara*, Messina.
- CIACCIO, 1994 - Gli uccelli dell'invaso di Lentini: Storia di una ricolonizzazione. In: LO VALVO M., MASSA B. & SARÀ M. (Eds). Uccelli e paesaggio in Sicilia alle soglie del terzo millennio - *Naturalista sicil.*, (IV ser.) 17 (suppl.): 283-291.
- DODERLEIN P., 1869-74 - Avifauna del Modenese e della Sicilia - *Giorn. Sci. Natur. Econom.*, 5: 137-195; 6: 187-236; 7: 9-72; 8: 40-124; 9: 28-93; 10: 35-71, 133-148.
- GATTO A. & RESTUCCIA V., 1999 - Guida agli Uccelli della R.N. di Vendicari - *Regione Sicilia*.
- GIGLIOLI E.H., 1907 - Secondo resoconto dei risultati dell'Inchiesta Ornitologica in Italia. Avifauna Italica - *Tip. S. Giuseppe*, Firenze.
- IAPICHINO C. & MASSA B., 1989 - The Birds of Sicily - *British Ornithologists' Union*, Tring, U.K.
- IENTILE & BAGLIERI, 1997 - Lo svernamento del Fistione turco *Netta rufina* nelle saline di Siracusa. In: BOGLIANI G., GALEOTTI P. & TORRE A. (a cura di). Atti IX Convegno Italiano Ornitologia - *Avocetta*, 21: 61.
- STRESEMANN, 1943 - Die Brutvogel des Sees von Lentini, Sizilien - *Orn. Monabster*, 51: 116-122.

ENZO SCIABICA

Via Treviso, 31 - 91026 Mazara del Vallo (TP)
E-mail: marmaronetta@tiscali.it

Riv. ital. Orn., Milano, 74 (2): 170-171, 30-XII-2004

**NIDIFICAZIONE DI RONDONE PALLIDO, *APUS PALLIDUS*,
NEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA**

ABSTRACT - *Breeding of Pallid Swift, Apus pallidus, in the Sila National Park (Calabria, Southern Italy)*

In Italia, il Rondone pallido, *Apus pallidus*, è migratore regolare nidificante e svernante irregolare (BRICHETTI & MASSA, 1998). La specie si riproduce lungo le coste, soprattutto sul versante tirrenico e sulle isole maggiori. Appare assente da tutte le aree interne della penisola, tranne che in diverse zone del