

Lo svernamento del Fistione turco *Netta rufina* nelle saline di Siracusa

RENZO IENTILE *, SALVATORE BAGLIERI**

*Via Grottasanta 61, 96100 Siracusa; **Corso Timoleonte 125, 96100 Siracusa

Lo svernamento del Fistione turco in Italia é limitato a piccole aree, principalmente dislocate, nella fascia costiera dell'alto Adriatico ma anche in Puglia, Lazio e Sardegna. I censimenti sugli anati svernanti, promossi su scala nazionale, hanno consentito di definire la consistenza numerica degli effettivi svernanti. Tra il 1975 e il 1981 (Chelini, 1984) il massimo numero registrato é stato di 72 individui in tutto il territorio italiano; l'I.W.R.B. riporta uno svernamento di 50-60 individui nei mesi di gennaio dell'84 e dell'85. Dati più recenti (Rose & Taylor, 1993) indicano un totale di 46 individui. In Sicilia la presenza di questa specie era legata all'esistenza del biviere di Lentini (SR), dove nidificava prima che l'area venisse bonificata, attorno agli anni '50. Iapichino e Massa (1989) lo considerano "Scarso (e irregolare?) migratore e svernante". Attualmente sono sporadiche le segnalazioni del Fistione turco in tutta l'isola, eccezion fatta per un'area umida di modeste dimensioni nel versante Sud-orientale: le saline di Siracusa.

Area di studio e metodi - Ubicate lungo la fascia ovest del Porto grande di Siracusa le ex saline si estendono per circa 50 ettari. Abbandonata l'attività della salicoltura nei primi anni '80 gli invasi isolati dall'acqua marina, alimentati esclusivamente dalle acque piovane, si sono rapidamente trasformati da ambiente salato in salmastro dolce. Di conseguenza si è sviluppata attorno una fitta fascia di *Phragmites australis*; il fondale degli stagni si è invece coperto di *Ruppia maritima* e di *Zannichella piaustris*. La protezione dell'area nel 1984 ha reso possibile la sosta prolungata di moltissime specie acquatiche. L'area è oggetto di censimenti regolari e frequenti, almeno un giorno alla settimana in ogni mese

dell'anno, dal 1989 a questa parte. Le regolari osservazioni hanno potuto definire un quadro completo dell'avifauna ospitata in questa zona. Fra le specie di maggior rilievo spicca il Fistione turco.

Risultati - Nell'arco di 9 anni é stato regolarmente avvistato, tranne che nell'inverno 90-91; ha svernato regolarmente con l'eccezione degli inverni 92-93 e 95-96 nei quali sono stati osservati sporadicamente degli individui in singole date. Gli arrivi sono rilevati tra la 1° e la 2° decade di dicembre; nel 1988 i primi due individui svernanti sono stati osservati il 18 novembre. Le partenze invece sono avvenute tra la 2° e la 3° decade di febbraio; alcuni individui si sono però trattenuti sino a marzo, nel 1995, ed altri sino alla 1° decade di aprile (10/4/90 un maschio, qualche giorno prima una femmina: sono i dati più tardivi). Abbiamo osservato la specie quasi esclusivamente in alcuni invasi delle saline, in cui il livello di acqua non è superiore ad 1 metro; il modo di alimentarsi è quello delle anatre tuffatrici, cioè di immergersi totalmente, ma talvolta si alimenta come le anatre di superficie immergendosi parzialmente. L'abbiamo visto condividere l'area con Moriglione *Aythya ferina*, Tuffetto *Tachybaptus ruficollis*, Svasso piccolo *Podiceps nigricollis*, Folaga *Fulica atra*; occasionalmente con Moretta *Aythya fuligula* e Moretta tabaccata *Aythya nyroca*.

Ringraziamenti - Desideriamo ringraziare Carmelo Iapichino, Andrea Corso e Giuseppe Consoli per il contributo nella raccolta dei dati.

Bibliografia - Brichetti P. *et al.* (red.). Fauna d'Italia. Uccelli, Vol. I. Calderini, Bologna. ● Iapichino C. e Massa B. 1989. Birds of Sicily. BOU. ● Rose P.M. e Taylor V. 1993. Western palearctic and south west Asia waterfowl census 1993. I.W.R.B., Slirbridge.

Tab. 1. Numero di individui di Fistione turco svernanti alle saline di Siracusa negli inverni tra il 1988 e il 1997. Sono riportati in parentesi gli individui segnalati in singole date: 21/12/92, 1; 11/12/95, 6; 2 e 3/01/97, 2 ind.

	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97
m	2	14		12	(1)	3	2	(2)	(2)
f	7	9		12		2	2	(4)	1
tot	9	23		24	(1)	5	4	(6)	1 (2)