

Nuovi avvistamenti

a cura di EMILIANO ARCAMONE e PIERANDREA BRICHETTI

Questo secondo numero della rubrica Nuovi avvistamenti raggruppa numerose interessanti segnalazioni che probabilmente sarebbero finite disperse in varie pubblicazioni. Questo grazie anche all'accordo intercorso tra la nostra redazione e quella della Rivista italiana di Ornitologia. Come di consueto facciamo appello alla collaborazione di tutti, soci e lettori, affinché gli avvistamenti di rilevanza nazionale non si perdano in mille rivoli ma confluiscono in questa nostra rubrica.

È stato snellito lo staff che cura la rubrica, per cui da questo momento si dovrà fare riferimento esclusivamente a:

Emiliano Arcamone (coordinatore), via Adolfo Tommasi 20/C, 57124 Livorno

Avvistamento invernale di Marangone dal ciuffo *Phalacrocorax aristotelis* nel Delta del Po

S. Volponi

L'avvistamento è avvenuto il 4 dicembre 1994 nella parte settentrionale della Sacca degli Scardovari (Rovigo). Nel corso di un censimento di Cormorani *Phalacrocorax carbo* al dormitorio, è stato osservato un individuo adulto o immaturo di questa specie, posato sulla massicciata posta a protezione dell'argine, in compagnia di numerosi cormorani.

• La specie compare irregolarmente sulle coste adriatiche. I recenti avvistamenti di gruppi nelle Marche (Pandolfi e Santolini, 1985: Riv.ital.Orn.55:31-40) potrebbero indicare una maggiore frequentazione di tali coste.

Svernamento di Marangoni minori *Phalacrocorax pygmeus* in Toscana e Puglia

(1) F. Cianchi (2) G. Marzano e S. Panzera

(1) Dal 3 gennaio al 5 febbraio 1996 un Marangone minore ha sostato al lago di Burano (Grosseto).

(2) Dal 7 gennaio al 1 aprile 1995 un gruppo di

Marangoni minori (min. 4 - max 13) ha svernato nei "Bacini di Ugento" (Lecce). Durante il giorno si associavano spesso ad un gruppo di Cormorani *Phalacrocorax carbo*.

• Le recenti segnalazioni invernali di questa specie in Puglia confermano la sua maggiore frequenza, registrata a partire dagli anni '80. L'avvistamento in Toscana, regione dove la specie risulta rarissima, è del tutto inusuale.

Avvistamenti di Pellicano *Pelecanus onocrotalus* in Toscana e Basilicata

(1) C. Giannella e F. Cianchi (2) M. Visceglia

(1) Il 9 agosto 1995 è stato osservato un individuo adulto mentre transitava in volo sul mare prospiciente il tombolo della Giannella, in direzione della Laguna di Orbetello (Grosseto). Lo stesso individuo ha sostato nella laguna alcuni giorni. Il 31 dicembre 1995 un individuo è giunto al lago di Burano (GR) dove ha sostato fino al 31 gennaio 1996. Lo stesso individuo nei primi giorni di febbraio è stato avvistato al vicino lago di S. Floriano e Bocca d'Ombrone (Grosseto).

(2) Nel periodo compreso tra il 24 novembre 1994 ed il 24 marzo 1995 un individuo adulto ha svernato nell'Oasi del lago di S. Giuliano (Matera).

• La specie è rara e irregolare in Italia durante le migrazioni ed ancor più nel periodo invernale. Ormai accidentale in Toscana, prima segnalazione per la Basilicata.

Osservazioni invernali di Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides* in Toscana

P. Sposimo

Il 14 gennaio 1995 ed il 17 gennaio 1996 è stata osservato un individuo di questa specie in prossimità di alcuni "chiari" di caccia (Gaina e Il Colle) della Piana Fiorentina.

• La specie è svernante occasionale in Italia. Singolare

la presenza per due anni consecutivi di un individuo localizzato in una medesima area.

Svernamento di Mignattaio *Plegadis falcinellus* nel Salento (Puglia)

G. Marzano

Dal 30 settembre 1995 al 5 febbraio 1996 un piccolo gruppo di Mignattaio (2-3 ind.) ha sostato nelle zone umide di Fiume Grande e Invaso del Cillarese (Brindisi).

• La specie è estremamente localizzata e scarsa come svernante in Italia (Sardegna, Sicilia). Nel resto del paese le soste prolungate di individui sono occasionali (per es. Toscana: Giovacchini, 1990: Avocetta 14: 136).

Avvistamento di Anatra marmorizzata *Marmaronetta angustirostris* in Puglia

F. Cianchi, L. Serra e M. Zenatello

Il 13 giugno 1995 un individuo di questa specie è stato osservato presso la Valle San Floriano, Zapponeta (Foggia). Era posato su un isolotto all'interno di una vasca d'acqua dolce, coperta da vegetazione idrofila rada. L'individuo, di sesso non identificato, era solo e apparentemente in buone condizioni. Nonostante il protrarsi dell'osservazione, non si è mai allontanato dall'isolotto.

• La realizzazione, in anni recenti, di programmi di introduzione di questa specie in alcune zone umide italiane, tra cui la riserva naturale "Le Cesine" (Lecce) rende questa segnalazione difficile da valutare, non essendo possibile, nel caso specifico, attribuirle con certezza ad un individuo di origine selvatica.

Avvistamento di Orchetto marino *Melanitta nigra* in Sicilia

R. Ientile

Una femmina immatura è stata osservata il 26 novembre 1994 vicino alla penisola di Magnisi (Siracusa).

• Si tratta della terza segnalazione regionale. Le osservazioni precedenti sono relative a due gruppi di individui osservati negli inverni 1988-89 e 1990-91 alla foce del Simeto (Catania).

Avvistamento di Orco marino *Melanitta fusca* in Sicilia

R. Ientile

Il 20 novembre 1993 sono stati osservati tre individui

in volo, diretti a nord, in località Capo Murro di Porco (Siracusa).

• Si tratta della 2° segnalazione per la Sicilia. La prima segnalazione è relativa al secolo scorso.

Presenza invernale di Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus* in Toscana

Y. Simoncini

Il 18 febbraio 1996 è stato osservato un gruppo di 15-20 individui di questa specie, alcuni in fase chiara, planare sulle pendici del Monte S. Giuliano (S. Giuliano, Pisa).

• L'avvistamento di questo accipitrade fa pensare ad una partenza precoce di un piccolo contingente svernante al limite settentrionale dell'areale di svernamento. Specie occasionale in inverno (cfr. Toso, 1982, 1983: Avocetta 6: 137-140, 7: 59-66).

Avvistamento di Poiana codabianca *Buteo rufinus* nel Salento (Puglia)

G. Marzano

Il 5 maggio 1995 nei pressi di Otranto (Lecce) è stato osservato un individuo di questa specie posato su un cumulo di pietre.

• Specie rara segnalata con certezza meno di 50 volte a livello nazionale.

Avvistamento di Poiana codabianca *Buteo rufinus* della forma scura in Calabria

F. Mordente, E. Brunelli, M. Morrone e S. Salerno.

Il 5 aprile 1997 è stato osservato e fotografato in provincia di Crotone, a 340 m s.l.m., un individuo della forma scura di questa rara specie.

• Si tratta del secondo dato per l'Italia di un individuo della forma scura (1 ind. 12.9.1984, Bergamo, Coll.I.N.F.S.). In passato la Poiana codabianca è stata segnalata in Calabria esclusivamente nell'area dello stretto di Messina (4 segnalazioni: Mingozzi in Brichetti et al., 1992, Fauna d'Italia, Uccelli I).

Prima segnalazione di Poiana calzata *Buteo lagopus* in Molise

M. Carafa, N. Colonna e L. De Lisio

Il giorno 11 febbraio 1996 è stato osservato e filmato con videocamera un individuo di questa specie nei

pressi della foce del fiume Biferno, tra i territori di Termoli e Campomarino (Campobasso). Questa poiana veniva attaccata insistentemente da gazze e cornacchie e si spostava con brevi voli tra gli alberi sparsi in un'area planiziale.

• Si tratta del primo avvistamento documentato per il Molise di una specie molto rara per l'Italia centro-meridionale (Micheli, 1992 in Brichetti et al., 1992, Fauna d'Italia, Uccelli I).

Avvistamento di Aquila imperiale *Aquila heliaca* sullo Stretto di Messina

A. Corso

Il 10 maggio 1995 un individuo immaturo (1° anno) della sottospecie tipo è stato osservato sul versante siciliano dello Stretto di Messina.

• Si tratta della 6° segnalazione per la Sicilia.

Primo caso di svernamento di Falco pescatore *Pandion haliaetus* in Puglia

G. Marzano e S. Panzera

Due individui di Falco pescatore sono stati ripetutamente osservati dal dicembre 1994 al 7 febbraio 1995 presso l'Oasi di protezione dei laghi Alimini (Lecce).

• Lo svernamento della specie in Italia è molto scarso e localizzato (per es. Sardegna). Inusuale la sosta di questa specie in Puglia.

Svernamento di Grillaio *Falco naumanni* in Basilicata

G. Palumbo

Un piccolo gruppo di individui di questa specie (max 5-6) è stato ripetutamente osservato nei mesi di gennaio e febbraio 1996 nelle campagne prossime al fiume Basento, Pomarico (Matera).

• La specie è parzialmente svernante in Italia. Regolare in Sicilia, da confermare come tale nell'Italia centro-meridionale (Massa in Brichetti et al., 1992. Fauna d'Italia, Uccelli I).

Nidificazione di Falco cuculo *Falco vespertinus* nel Ferrarese

R. Tinarelli

Il 4 giugno 1996 nella bonifica del Mezzano è stato trovato un nido di Gazza *Pica pica*, provvisto di

copertura, occupato da una coppia di questi falchi. In prossimità del nido si trovava un pullus ben sviluppato ma ancora coperto di piumino. I giovani, almeno 2, si sono involati tra il 25 e il 30 giugno. Il 4 luglio il nido non era più frequentato.

• Interessante segnalazione che conferma il fenomeno di colonizzazione delle regioni settentrionali iniziato nel 1995 e forse già nel 1993 nel Parmense.

Prima nidificazione di Avocetta *Recuvirostra avosetta* nel Modenese

R. Tinarelli

Una coppia ha nidificato nel 1996, senza successo, nella zona umida denominata "La Tomina", creata nel 1995 nel comune di Mirandola (Modena).

• Si tratta di uno dei pochissimi casi di riproduzione rilevati in Italia in zone umide d'acqua dolce lontane da ambienti costieri (circa 90 km dal mare).

Avvistamento di Pavoncella gregaria *Chettusia gregaria* in Puglia

M. Basso e M. Zenatello

Il 15 marzo 1995 è stato osservato un individuo di questa specie presso la Riserva Naturale di Frattarolo, Manfredonia (Foggia). L'esemplare era associato ad un dormitorio di 50 Pavoncelle *Vanellus vanellus*, localizzato in una area coperta da salicornieto, a margine di una superficie allagata di piccole dimensioni.

• Questa specie è stata segnalata una quarantina di volte in Italia, quasi esclusivamente nelle regioni centro-settentrionali e nel periodo autunnale.

Svernamento di Piovanello maggiore *Calidris canutus* nella Laguna di Venezia

L. Serra e S. Focardi

Il 18 gennaio 1995 sono stati osservati 2 individui di questa specie presso il Bacàn di S. Erasmo (Venezia). I soggetti si trovavano presso un posatoio di alta marea occupato da oltre 8000 limicoli.

• La presenza invernale nella laguna di Venezia è irregolare; il più consistente nucleo italiano sverna nel Delta del Po (74 ind. nel 1994).

Avvistamenti di Piro piro pettorale *Calidris melanotos* nel Lazio ed in Sicilia

(1) R. Ientile e (2) M. Trotta

(1) Un individuo è stato avvistato e fotografato in un

piccolo stagno vicino alle Saline di Priolo (Siracusa) dal 12 al 14 maggio 1996.

(2) Il 9 e 10 novembre 1996 è stato osservato e fotografato un individuo al Lago di Caprolace (Parco Nazionale del Circeo).

- Si tratta della 8° e 9° segnalazioni italiane, l'ultima delle quali in Sardegna nel 1994 (Nissardi e Murgia in Arcamone e Brichetti, 1996: Avocetta 19: 229-232). Si tratta del primo avvistamento per il Lazio. Numerosissime le segnalazioni nella Regione Palearctica occidentale, dove è ormai considerato visitatore quasi regolare.

Sosta primaverile di Gambecchio frullino *Limicola falcinellus* nel Siracusano

A. Corso

Dal 16 aprile al 7 maggio 1995 un individuo adulto di questa specie è stato osservato a Vendicari (Siracusa).

- Si tratta della 7° segnalazione siciliana; quella precedente era stata registrata l'anno prima, nello stesso luogo e periodo.

Eccezionale presenza invernale di Croccolone *Gallinago media* in Toscana

D. Occhiato, A. Corso e R. Gildi

Il 7 dicembre 1996 in prossimità degli stagni delle Macchiozze a Bocca d'Ombrone (Grosseto) è stato ripetutamente osservato un individuo di questa specie, in pastura con alcuni Beccaccini *Gallinago gallinago* in un prato umido.

- Dovrebbe trattarsi del primo caso di presenza invernale certa in Italia.

Prima nidificazione di Pittima reale *Limosa limosa* nel Bolognese

R. Tinarelli

Il 29 maggio 1996 in una zona umida del settore orientale della pianura Bolognese sono stati trovati in nido con 3 uova e altre due coppie in allarme verso gli umani e in mobbing su Falco di palude *Falco aeruginosus*. La nidificazione non ha avuto successo probabilmente a causa del maltempo e/o delle attività agricole compiute nell'area.

- La nidificazione di questa specie si verifica annualmente con pochissime coppie solo in Piemonte.

Svernamento di Chiurlottello *Numenius tenuirostris* in Puglia

N. Baccetti, L. Serra e M. Zenatello

Durante i censimenti di uccelli acquatici svernanti organizzati dall'INFS, il 21 gennaio 1995 e quindi fino al 28 marzo 1995, è stato ripetutamente osservato uno stormo di 18-19 individui nei pressi della zona umida di Frattarolo, Manfredonia (Foggia), in associazione con Pavoncella *Vanellus vanellus* e Chiurlotto *Numenius phaeopus*.

- Si tratta di uno degli stormi più consistenti osservati negli ultimi decenni, sia in aree di sosta migratoria sia di svernamento. Sono note per la zona, inclusa tra i siti chiave per la conservazione della specie, diverse osservazioni recenti in periodo di migrazione.

Sosta primaverile di Chiurlottello *Numenius tenuirostris* in Sicilia

A. Corso

Il 31 marzo 1996 un individuo è stato osservato e fotografato in un'area adiacente il Lago di Lentini (Siracusa).

- La Sicilia rappresenta un'area storicamente importante per la specie sia in periodo di svernamento sia soprattutto nella migrazione primaverile.

Osservazioni di Totano zampegiale minore *Tringa flavipes* in Sicilia

R. Ientile

Un individuo giovane di questa specie è stato osservato il 31 ottobre 1995 alle Saline di Siracusa e dal 1 al 3 novembre 1995 alle Saline di Augusta.

- Si tratta della 6° segnalazione per l'Italia, la prima per la Sicilia.

Avvistamenti di Piro piro del Terek *Xenus cinereus* nel Lazio

N. Henson e M. Trotta

Nei giorni 4 maggio e 12 ottobre 1996 sono stati osservati singoli individui di questa specie in sosta al Lago di Fogliano (Parco Nazionale del Circeo).

- Si tratta del 3° e 4° avvistamento avvenuti nel Lazio di questo limicolo che recentemente sembra essere osservato con maggiore frequenza lungo il litorale tirrenico (Toscana: Arcamone e Tellini, 1991-1992: Quad. Mus. St. Nat. Livorno 12:37-66; Arcamone ined.).

**Primo svernamento italiano di Piro piro del Terek
Xenus cinereus in Sicilia.**

A. Ciaccio e A. Corso

Tra il 17 dicembre 1994 e l'11 marzo 1995 un individuo adulto ha sostato alla foce del Simeto (Catania). Il soggetto, in perfette condizioni fisiche, si manteneva di preferenza solitario.

• Si tratta del primo caso di svernamento per l'Italia ed il terzo per l'Europa.

**Presenza invernale di Falaropo beccosottile
Phalaropus lobatus in provincia di Foggia**

E. Arcamone, N. Baccetti, M. Basso, L. Serra e M. Zenatello

Presenza invernale di un singolo individuo nella Riserva naturale Salina di Margherita di Savoia (22.1.93), affiancato da altre osservazioni (2.10.93, 19.3.94, 13.9.94, 16.3.95) che farebbero supporre il ripetersi dell'interessante evento nei due inverni successivi. Il soggetto frequentava vasche salanti parzialmente allagate, in associazione a Piovanello pancianera *Calidris alpina* e Gambecchio *Calidris minuta*.

• La specie è di comparsa regolare in questa salina durante le migrazioni (aprile-maggio e agosto-settembre) ma lo svernamento è un fatto occasionale in tutto il paese.

Avvistamento di Falaropo beccolargo *Phalaropus fulicarius* in Sicilia ed in Emilia-Romagna

(1) A. Corso (2) R. Tinarelli

(1) Dal 22 febbraio al 7 aprile 1995 un individuo del 1° inverno è stato osservato nelle saline di Priolo (Siracusa).

(2) Il 14 giugno 1996 è stata osservata una femmina in abito nuziale nella parte meridionale delle Valli di Comacchio (Ravenna).

• Si tratta della 3° segnalazione siciliana; l'ultima è avvenuta nel dicembre 1976.

Avvistamento di Stercorario maggiore *Stercorarius skua* in provincia di Venezia

F. Scarton e S. Borella

Il 15 luglio 1994 è stato osservato un immaturo in Val di Brenta, laguna meridionale di Venezia, disturbato in volo da un gruppo di Gabbiani reali *Larus cachinnans*.

• Dovrebbe trattarsi della prima segnalazione per la laguna di Venezia.

Avvistamento di Gabbiano corallino *Larus melanocephalus* in provincia di Pavia

F. Ferlini

Il 6 novembre 1994 è stato osservato un individuo adulto in abito non-riproduttivo sul Po a Bastida Pancarana (Pavia) in compagnia di alcuni Gabbiani comuni *Larus ridibundus*.

• Le segnalazioni di questa specie nelle acque interne della pianura padana sono piuttosto rare e irregolari.

Osservazione invernale di Mignattino *Chlidonias niger* in Sicilia

R. Ientile

Il 3 gennaio 1996 in provincia di Siracusa è stato osservato un individuo in abito riproduttivo.

• Le presenze invernali di questa specie sono rare e irregolari in Italia.

Osservazione invernale di Cuculo *Cuculus canorus* in Lombardia

L. Dotti e M. Pavia

Il 9 dicembre 1994 lungo la sponda orientale del lago di Garda, in loc. Monte Pomo, nel comune di Garda (Verona), è stato udito ripetutamente il canto di un Cuculo in un pendio esposto ad ovest coperto da una boscaglia xerotermitica.

• Si dovrebbe trattare della prima segnalazione invernale della specie in Italia.

Presenze invernali di Rondone *Apus apus* in Toscana e Sicilia

(1) A. Corso, (2) P. Giovacchini

(1) Tra il 26 dicembre 1994 e l'11 gennaio 1995 è stato osservato un individuo nelle vicinanze delle Saline di Siracusa. In date ripetute del gennaio 1995 sono stati osservati 3-4 individui presso il porto di Catania.

(2) Il 13 gennaio 1996 un individuo è stato osservato per circa un ora compiere voli bassi in prossimità di una costruzione abbandonata nei pressi di Bocca d'Ombrone (Grosseto).

• Specie rara e irregolare in inverno nel nostro paese.

Si tratta dei primi casi certi di svernamento in Toscana e Sicilia.

Svernamento di Balestrucci *Delichon urbica* in Sicilia

A. Corso e C. Iapichino

Il 23 gennaio 1994 è stato osservato un gruppo di 20 individui in volo di caccia su di un campo ai piedi di Noto (Siracusa). Almeno 10 ind. presentavano remiganti abrase o mancanti del tutto. Il gruppo era presente in loco dai primi di gennaio.

• Le presenze invernali della specie in Italia sono piuttosto rare e normalmente riferibili a individui singoli.

Svernamento di Calandro maggiore *Anthus novaeseelandiae* in Sicilia

A. Corso e G. Testolino

Negli inverni 1994/1995 e 1995/1996 sono stati osservati alcuni individui in alcune località costiere della Sicilia. Un individuo ha svernato dal 13 novembre 1994 al 10 gennaio 1995 presso la foce del Simeto (Catania). Lungo la fascia costiera siracusana sono stati osservati, un individuo il 7 novembre 1995 e due il 24 febbraio 1996. L'individuo osservato alla foce del Simeto frequentava i campi incolti adiacenti il corso del fiume e la foce privilegiando le zone con bassa vegetazione.

• Si tratta dei primi casi di svernamento in Sicilia. Si devono ricordare i recenti e ripetuti casi di svernamento nel Lazio (Biondi, Pietrelli e Guerrieri, 1996: Riv. Ital. Orn. 65:101-112).

Svernamento di Cutrettola *Motacilla flava* in Sicilia

A. Corso e A. Ciaccio

Durante tutto l'inverno 1994/1995 sono stati osservati 4 individui all'interno dell'invaso artificiale di Lentini (Siracusa). Tutti gli individui appartenevano alla ssp *flava*. La zona frequentata era limitata ad un prato acquitrinoso circondato da un canneto, utilizzato come roost.

• Primo caso certo conosciuto di svernamento per l'Italia.

Avvistamento di una Cutrettola *Motacilla flava* "a testa bianca" all'Isola d'Elba (Arcipelago Toscano)

I. Galleschi e S. Sacchetti

Il 27 aprile 1996 in località Mola, Porto Azzurro è

stato osservato un individuo di una sottospecie "a testa bianca". Questa cutrettola si trovava in compagnia di un gruppo di 30 individui della stessa specie in migrazione.

• L'attribuzione esatta della sottospecie risulta problematica; individui con caratteristiche simili possono essere riferiti alla subsp. *beema*, distribuita dal Volga al Lago Baykal, o, alla subsp. *leucocephala*, presente in Mongolia e nel Sinkiang.

Avvistamento di Usignolo d'Africa *Cercotrichas galactotes* nel Siracusano

A. Corso

Un individuo della sottospecie tipo è stato osservato il 25 aprile 1996 a Vendicari (Siracusa).

• Si tratta delle 16° segnalazione siciliana; la precedente risale all'aprile 1986. Le segnalazioni al di fuori delle isole circumsiciliane, con la presente, sono solo tre. In queste isole, per altro, questa specie potrebbe risultare regolare a seguito di ulteriori indagini.

Nidificazione di Pettazzurro orientale *Luscinia svecica svecica* sulle Alpi svizzere (Val Bregaglia)

C. Croci

Nella stagione riproduttiva 1997 è stata accertata la nidificazione di due coppie della sottospecie tipo "a macchia rossa" in una brughiera alpina a 1950 m di quota.

• Importante riconferma della presenza riproduttiva di questa rara specie in una zona delle Alpi svizzere non lontanissima da quella delle analoghe osservazioni del 1983-85.

Invasione di Culbianco isabellino *Oenanthe isabellina* in Sicilia

A. Corso

Tra il 3 marzo ed il 12 aprile 1995 nel sud della Sicilia è stato seguito un transito a carattere invasivo della specie. Sono state registrati 59 avvistamenti avvenuti lungo la fascia costiera. Le province interessate sono state quelle di Siracusa (48 osservazioni), Ragusa (9), Catania (1) e Caltanissetta (1).

• La Sicilia si conferma come l'unica regione italiana dove la specie compare annualmente anche in discreto numero.

Avvistamento di Monachella dorsonero *Oenanthe pleschanka* nel Siracusano

A. Corso

Il 19 settembre 1995 è stato osservato un maschio al 1° inverno sulla penisola Magnisi.

- Prima osservazione siciliana. La specie è accidentale anche per l'Italia, trattandosi della 10° segnalazione.

Avvistamenti di Monachella del deserto *Oenanthe deserti* nel Siracusano

A. Corso

Il 2 e il 4 marzo 1996 un maschio adulto della ssp. *atroregularis* è stato osservato a Punta Raganzino, Marina di Modica (Siracusa).

- Si tratta della 9° segnalazione siciliana della specie; la precedente era avvenuta nel marzo 1982. La specie potrebbe essere meno occasionale di quanto ritenuto.

Avvistamenti di Silvia di Rüppell *Sylvia rueppelli* nel Siracusano

A. Corso

Il 22 marzo 1996 una femmina adulta di questa specie è stata avvistata a Capo Murro di Porco (Siracusa), pochi giorni dopo, il 16 aprile 1996 un maschio adulto è stato osservato sulla penisola Magnisi.

- Specie migratrice irregolare (8 segnalazioni conosciute). Si tratta della prima femmina rinvenuta in Sicilia, eccettuata quella osservata a Pantelleria nel giugno 1970 (Moltoni, 1970: Riv. ital. Orn. 43:380).

Nidificazione tardiva di Cinciallegra *Parus major* in provincia di La Spezia

G. Bedini

Dal 21 al 31 ottobre 1995 è stata accertata la nidificazione della specie, avvenuta in una cassetta nido posta nel giardino di una abitazione di Dogana di Ortonovo. All'interno del nido si trovavano 5 uova non schiuse e 3 pulli che si sono involati nei giorni compresi tra il 27 ed 30.

- La nidificazione della specie in una data così tardiva è considerata eccezionale in tutta Europa.

Osservazione di Corvo *Corvus frugilegus* in Sicilia

A. Corso

Il 18 aprile 1995, durante i censimenti dei rapaci in

migrazione sullo Stretto di Messina, è stato osservato un Corvo in zona Portella di Castanea (Messina). L'individuo seguiva la stessa rotta dei rapaci in transito.

- La specie è molto rara e irregolare nell'Italia centro-meridionale e nelle isole. Per la Sicilia l'unica altra osservazione posteriore al 1955 risale al gennaio 1976.

Sosta primaverile di Storno nero *Sturnus unicolor* all'Isola di Capraia (Arcipelago Toscano)

D. Occhiato

Due individui in abito riproduttivo sono stati osservati il 24 aprile 1995 nei pressi del campo sportivo mentre pasturando in compagnia di alcune Calandrelle *Calandrella brachydactyla*.

- La specie è sedentaria e nidificante localizzata (Sardegna e Sicilia). La sua comparsa in Toscana e nelle isole dell'arcipelago è occasionale. Probabilmente, in questo caso, si tratta di individui erratici provenienti dalla Corsica, spinti dai forti venti dei giorni precedenti l'avvistamento.

Cattura di Crociere fasciato *Loxia leucoptera* sulle Prealpi Bergamasche

M. Schiavi, G. Gottardi e D. Rubolini

Una femmina adulta di questo raro fringillide è stata catturata e inanellata (anello INFS Z173462) il 23 agosto 1997 nella Stazione ornitologica "La Passata" in località Miragolo S.Marco di Zogno (BG).

- Questa specie capita raramente e irregolarmente quasi esclusivamente nelle regioni alpine.

Osservazioni estive di Ciuffolotto scarlatto *Carpodacus erythrinus* sulle Alpi piemontesi (Val d'Ossola)

R. Bionda

Un maschio subadulto è stato osservato in canto il 21 e 22 giugno 1995 sull'Alpe Devero (Verbania), a 1630 m di quota.

- Osservazione in periodo riproduttivo in ambiente potenzialmente idoneo alla nidificazione della specie. Si deve peraltro segnalare la presenza di maschi in canto in periodo tardo primaverile sono stati osservati anche in altre zone alpine (Molinari e De Franceschi, 1996: Riv. ital. Orn. 66:78-80) e in Italia centrale (Toscana: Arcamone et al., 1988: Riv. ital. Orn. 58:209-210).

Osservazioni invernali di Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis* in Puglia

G. Marzano e S. Panzera

Il 23 novembre 1994 è stata osservata una coppia di questi zigoli in località Salina Vecchia, Brindisi. Nella

stessa località il 14 dicembre 1992 erano presenti 15 individui.

Interessanti avvistamenti di una specie molto rara nell'Italia meridionale. Degna di nota la presenza di un gruppo consistente, in quanto a queste latitudini la specie viene di solito osservata con individui singoli.